

類

證

治

裁

類證治裁卷之三

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝木校印

脾胃論治

脾胃皆屬土。脾為己土。而臟腑分焉。脾為臟。胃為腑。凡臟主守。經言胃為水穀之海。飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。脾主為胃行其津液者也。故胃主納。脾主運。胃喜涼。脾喜燥。昔人每多混治。惟葉氏醫案謂脾宜升則健。胃宜降則和。太陰溼土。得陽始運。陽明陽土。得陰始安。以脾喜剛燥。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽氣。其治在

脾又言五臟以守為補六腑以通為補卓然有見岫雲華氏稱其

議論超出千古其敘葉案曰脾胃論莫詳於東垣其中補中益氣調

益胃諸湯以勞倦內傷為主故用人參黃耆以補中白朮以溫燥升麻升下

陷之清陽陳皮理中宮之氣滯以太陰惡溼而病人胃陽衰者居

多用之得宜效如桴鼓若脾陽不虧胃有燥火則當用香巖養胃

陰之法凡病後熱傷肺胃津液以致虛痞不食舌絳噎乾煩渴不

寐便不通爽此九竅不和皆胃病豈可以耆朮治乎故先生必用

降胃之法所謂胃宜降則和者非辛開苦降亦非苦寒下奪以損

胃氣不過甘平或甘涼濡潤以養胃陰則津液來復使之通降而

已此即宗內經六腑者傳化物而不藏以通為用之理也故治胃

陰虛不饑不納。用清補。如麥冬、沙參、玉竹、杏仁、白芍。治胃陽虛。食穀不化。用通補。如人參、益智、陳皮、厚樸、烏藥、茯苓。治脾陰虛。胸膈便難。用甘潤。如甘草、大麥仁、白芍、當歸、杏仁、麻仁、紅棗、白蜜。治脾胃陽虛。吞酸、噯腐。用香燥。如砂仁、丁香、香炒朮、神麴、穀芽、乾薑。治脾胃陽虛。運納俱少。食已欲瀉。用升降法。如補中益氣湯。加茯苓。治溼傷脾胃。用平胃散。或清治中氣虛。用補中益氣湯。治饑傷。痛而納食稍安。病在。當甘緩以養脾營。當歸建。治食傷。傷食惡食。當分消胃土。用生益智、草果、廣查肉、神麴、煨薑。病後調理脾元。參苓白朮散。其分治合治。於病情尤為允愜者矣。

白水炒用則守。生用則和。甘草炒用則補。生用則瀉。火右方分列。

脾胃大抵脾臟以守為補胃腑以通為補脾宜升運胃宜通降也其方治與飲食症參觀則備矣。

附方

補中益氣湯

見一卷中風

調中益氣湯

即補中益氣湯去歸朮加木香蒼朮

升陽益胃湯

六君子加澤瀉薑棗
青芎羌獨防柴連

四君湯

參苓六君湯
水草加陳皮名異功散加半夏名

益黃散

陳皮一兩二錢
青皮訶子肉炙草各五錢丁香

平胃散

見一卷溼

清暑益氣湯

見一卷暑

饑傷病後脾腎胃火脾溼和胃

當歸建中湯
芍 桂 飴 草 薑 棗 當歸

參苓白朮散
梗 參 苓 朮 草 山藥 扁豆 蓮子 桔

蟠桃果
芡實 蓮子 核桃 熱地 棗肉 用猪腰子摻

安胃飲
黃芩 石斛 澤瀉 木通 陳皮 查肉 麥芽

半夏枳朮丸
半夏 枳 朮

養胃湯
人參 藿香 厚樸 蒼朮 各一錢 茯苓 錢二分

生薑三片水煎
陳皮 錢五分 草果 炙草 各六分 加烏梅二個

--	--	--


脾胃

張

髫年寒熱肢冷食少便瀉尙作瘡治遂神疲色慘脉沈須防慢驚急理脾陽先用理中湯少加附子手足乃溫專用異功散加蓮棗理脾熱減瀉止

於脇痛吞酸已止肝火悉平但中脘氣窒口燥不知饑右脉欠和胃陰未復用沙參麥冬花粉當歸白芍栝蘂小麥蔗汁三服得平

姜左脉浮而鉤右弦緩脘中久痛納食稍緩乃饑傷脾絡所致經言脾欲緩急食甘以緩之勿用平肝克伐生氣潞參當歸鬚白芍飴糖紅棗甘草牡蠣粉糯稻根鬚降香末數劑而安



飲食症論治

飲以養陽。食以養陰。飲食人所以衛生。而脾胃實生之本也。胃旺則多食不滯。過時不饑。脾運則分輸五臟。榮潤四肢。若生冷戕胃。饑飽戕脾。中氣先餒。不宜專事消導。宜補中益氣湯。加茯苓砂仁。夫中氣即脾胃沖和之元氣也。然胃氣以下行為順。脾氣以健運為能。胃強脾弱。則消穀而便溏。脾強胃弱。則知饑而納少。故胃陽虛。飽食輒噯者。宜溫通。如橘紅厚樸益智枳殼。半夏麴草蔻蘇子穀菔。若守補則壅。忌炙草魚白朮炮薑。脾陽虛多食不化者。宜香燥。如砂仁丁香木香白朮半。夏神麴薏苡橘白雞內金。若膩補則滯。忌地黃黃芩肉脾胃陰虛。不饑不食。口淡無味者。宜清潤以養之。如沙參扁豆當歸白芍麻仁。若消導則耗氣劫液。忌枳檳查肉。傷飲惡飲傷食。糯米大麥仁。蘿葡子麴蘖。

惡食嘔而腹滿為胃寒生痰。

和胃二陳煎。

食填太陰腹悶絞痛為木鬱。

食厥急吐之。

用陰陽水燒鹽湯探吐。痛定後服藿香散。

飲食留滯脘痞腹脹者為腑氣。

不宜消導之。

大和中飲。

飲冷吐利脾元受困者溫其寒。

理中湯或溫胃飲去黃者。

食

下氣逆噦呃噎膈者開其鬱。

神香散加橘皮竹茹半夏。

食後動怒脇滿而痛者。

平肝氣。

柴胡枳殼香附青皮山梔子生白芍。

飲酒傷中發熱嘔瀉者利其溼。

葛花解酲湯。

肝胃不和脉弦脘痺者泄木安土。

木瓜吳萸白芍金橘益智良薑紅棗小麥。

虛寒滑脫者溫中補陽。

四維散。

但腎陽衰者。

二神丸。

凡嗜熱酒者脘

必瘀血。

宜鬱金木香丹參當歸降真香。

喜冷食者症多中寒。

宜八味理中丸。

胃虛則嘔悸

動風。

宜牡蠣白芍茯苓人參棗仁炙草阿膠。

胃實則痞滿內熱。

枳實消痞丸。

脾虛則

食後反飽。

異功散去甘草加砂仁穀芽。

脾痺則口甜畏食。

佩蘭葉煎湯。

胃上逆則導

其濁滯。豆豉、枳實、竹茹、桔梗、薤仁、橘皮。脾下陷則升其清陽。舉元、瀝

傷脾胃。腹腫便難。宜兼升降。則運化宣通。半夏、砂仁、枳實、草薢、煨薑、橘白。

若飲食不甘。口苦不寐。膽熱乘脾者。宜導痰洩熱。則土鬱舒。溫膽、加味

湯去熟地。加丹皮。食已吐酸。肝逆犯胃者。宜降火洩濁。則木鬱達。山梔、桑葉、生薑、杏仁、橘。

戊己丸。加茯苓、山梔。其飲食減少。有脾胃虛熱。安胃、有中氣虛寒。

腸痞者。黃連、瀉心湯。其飲食減少。有脾胃虛熱。安胃、有中氣虛寒。

煎。有中寒虛痞。治中、有思慮傷脾。歸脾。有脾溼水瀉。加味、平胃

湯。有胃氣痛逆。調胃、平、不能食而瘦多脾虛。宜山藥、茯苓、白朮、炙

內金、砂仁、陳皮、蓮。善食而瘦多胃火。去木通、加生地、白芍。一切食

滯成積。消食、凡旦晝陽盛穀氣易消。食可飽。暮則陰盛穀氣難化。

食宜少。夏暑秋涼。晚餐尤宜簡泊。則脾不困。胃不滯矣。

附方

補中益氣湯 見一卷中風

和胃二陳煎 夏 陳 蒼 草 炮薑 砂仁 棗

大和中飲 查 樸 枳 夏 陳 乾薑 澤瀉 木香

理中湯 見一卷中風

溫胃飲 白蔻 人參 澤瀉 益智 砂仁 厚樸 甘草

神香散 丁香 蔻仁 薑黃 黃耆 陳皮

葛花解醒湯 見一卷溼

四維散 人參 四兩 附子 炮薑 各二錢 烏梅 五分 炙

二神湯 故紙 肉蔻 棗肉 薑汁 每服二錢 加吳茱萸 五味 名

補中 消痰 導溫 去寒 開鬱 酒傷 補陽 腎陽

溫中 痞 滿 痞 熱 補 脾 導 滯 升 陽 膽 熱 吐 酸 脇 痞 虛 熱

八味理中丸 理中加茯苓 麥芽 神麴 砂仁

枳實消痞丸 枳實 黃連各五錢 厚樸四錢 苓 朮 薑 草 夏 麥芽各二錢

生薑瀉心湯 苓 連 參 草 夏 乾薑 生薑 大棗

異功散 見一卷中風

小承氣湯 見一卷溫

舉元煎 參 耆各三錢 朮 草各一錢 升麻五分 薑 棗 水煎

溫膽湯 見一卷溫 加入參 遠志 棗仁 熟地 名十 味溫膽湯

戊己丸 黃連 吳萸 白芍

黃連瀉心湯 黃連酒炒水煎服

安胃飲 見本卷脾胃

虛寒虛痞思傷去溼溼瀉胃氣胃火清胃食積補元

養中煎

參 苓 薑 草 山藥 扁豆

治中湯

參 木 薑 草 青 陳 半 加生薑

歸脾湯

見二卷勞瘵

平胃散

見一卷溼 加扁豆 木通 名加味平胃散

胃苓湯

見一卷中風

調胃平氣湯

見一卷中風

瀉黃散

見一卷火

太清飲

知母 石斛 木通各一錢半 石膏三錢 麥冬

消食丸

查肉 神麴 麥芽 蘿蔔子 青皮 陳皮 香

參水膏

人參 白朮 附各二兩 阿魏一兩

嘔吐論治

嘔吐症。胃氣失降使然也。而多由肝逆衝胃致之。靈樞謂足厥陰所生病者。胸滿嘔逆是也。夫胃司納食。主乎通降。其上逆而嘔吐者。乃肝邪犯胃。或胃虛肝乘。故治嘔吐必泄肝安胃。用藥主苦降。辛通。佐以酸泄。其肝陽上亢。食入嘔吐者。用苦辛降逆。如黃連、川楝子、吳茱萸、薑汁之屬。或苦酸泄熱。如烏梅、白芍、木瓜、枳實、左金丸、戊己湯。其胃陽衰。風木乘克。食入不變者。用溫胃平肝。如人參、乾薑、丁香、香薷、半夏、青皮、白芍、或吳茱萸、黃湯。其脾陽衰。不能運化。腹脹痛嘔者。用辛溫行滯。益智、厚樸、神麴、香砂六君湯。其胃虛客氣上逆。噫噎欲嘔者。用鹹以軟痞。重以鎮逆。旋覆代赭湯。其中陽虛。濁陰犯胃。吐黑綠苦水者。用辛熱開濁。理中湯、加川椒、半夏、附子、茯苓之屬。

時吐清水者。用辛熱扶陽。附子理中湯。真武湯。其肝火鬱熱。吞酸吐酸者。用

辛鹹苦降。左金丸。或鹽炒。其胸痞痰阻。食已漾漾欲吐者。用辛泄。

生薑瀉心湯。或二陳。其肝厥上逆。腕痛嘔涎者。用辛通。佐以酸泄。

如川椒。乾薑。桂枝。其因驚怒動肝。致脇痛乾嘔而液虛者。用辛通。

烏梅。白芍。半夏。其因驚怒動肝。致脇痛乾嘔而液虛者。用辛通。

潤補。大半夏湯。加茯神。麥冬。青皮。白芍。當歸。其支飲。湯水下咽嘔吐者。用辛泄。小半

其肝陰胃津兩虛。肝風擾胃嘔吐者。用柔劑滋液熄風養胃。如人參。白

芍。麥冬。阿膠。小麥。半。其肝風犯胃嘔吐眩暈者。用苦酸以和陽。黃

連。白芍。烏梅。其嘔傷胃津熱邪乘胃。食入即吐者。用辛涼化痰。溫

牡蠣之屬。其氣衝膈欬吐逆者。肝火上凌。過胃犯肺。用清肅苦降。蘇

山梔。杏仁。枇杷葉。前胡。其氣衝心痛。饑不欲食。吐衄者。用苦辛酸以

伏蟲。理中安。虵厥者。臟寒。虵上入膈。口乾。心煩。手足冷。脈沈遲。宜
寒熱互用。酸苦雜投。烏梅丸。臟厥者。陽氣垂絕。痛嘔不納。躁擾不安。
安胃丸。或半夏。其久嘔致傷肝腎。并衝脈上逆者。用溫通柔潤。如
瀉心湯。加枳實。其厥陰濁邪上攻。痛從少腹逆衝為嘔者。用
藜蘆。茯苓。當歸。杞子。桂心。沙苑子。鹿角霜。其厥陰濁邪上攻。痛從少腹逆衝為嘔者。用
辛溫泄濁。如吳黃小茴桂枝。韭白汁。茯苓。其嘔而絕粒者。取生鷺。每食必吐者。煮
血熱。皆立止。食之。

集諸名家嘔吐噦治法

有聲有物為嘔。有物無聲為吐。有聲無物為噦。昔人以嘔屬陽明。
吐屬太陽。噦屬少陽。噦即乾嘔。東垣以三者俱屬脾胃虛潔。古從三焦
分別三因。上焦在胃口。主納。中焦在中脘。主腐熟水穀。下焦在臍

下主出而不納。上焦吐者因於氣。食已即吐。渴欲飲水。治當降氣。

和中。中焦吐者因於積。或先痛後吐。或先吐後痛。治當去積和氣。

下焦吐者因於寒。朝食暮吐。暮食朝吐。溏清便閉。治當通其閉。溫

其寒。後人又分隨食隨吐為嘔。小半夏湯。食入乃吐為暴吐。生薑橘

已後吐為嘔吐。橘皮半夏湯。枳桔湯。食久乃吐為反胃。金花丸。食再

而吐者為翻胃。紫沈丸。旦食暮吐。暮食朝吐。下焦病。半夏生薑。此從

食下久暫分上中下脘而治者也。古法嘔吐氣壅穀不得下。小半

胃虛穀氣不行。嘔而液傷。大半夏湯。胸滿食穀欲嘔。吳茱萸湯。心下痞嘔而

腸鳴。半夏瀉嘔而思水。飲停膈上。猪苓散。乾嘔噦手足厥。橘皮噦逆

虛熱。橘皮竹噦逆虛寒。半夏乾嘔噦胃口有痰。二陳湯。寒吐者肢

冷脈細。二陳湯加丁香炮薑。熱吐者煩渴脈洪。二陳湯加梔連竹

根。諸藥不效。紅豆丸。肝火入胃。左金丸。由脾氣鬱結。歸脾湯。由肝脾鬱

滯。香砂六君湯。怒時飲食嘔吐胸滿膈脹關格不通。二陳湯加青皮木

薤薤。由痰積者遇寒輒發。薤仁丁香砂仁。由食滯者消導乃安。

山查麥芽神麴陳皮。先吐後瀉身熱腹悶名曰漏氣。因上焦傷風

枳殼厚樸砂仁雞金。因下焦實熱。吐而中氣久虛。

湯。二便不通氣逆不續名曰走哺。人參湯主之。吐而中氣久虛。

必借穀食以和之。焦米神麴參苓苡米。吐而諸藥不效必假重鎮

以墜之。靈砂丹。病久胃虛嘔吐者。六君湯比和飲。病後胃熱煩嘔

者。竹葉石膏。嘔苦耶在膽經。芩連與黃半夏。吐酸實之肝臟。挾熱

金丸加竹茹山梔白蔻生薑挾寒。嘔清水者多停飲。二木二吐涎

者左金丸加丁香乾薑白木沈香。嘔清水者多停飲。陳湯。

沫者以脾寒。六君湯加益智生薑。吐蚘蟲者或由胃冷。理中湯加
下烏梅丸或由胃熱。安蚘丸。或由寒熱交錯。烏梅丸。或由胃虛求食。溫胃飲
凡嘔吐而心痛當作火治。口吐清水當作蟲治。心中如火當作血
虛治。

嘔吐脈候

陽緊陰數爲吐。陽浮而數亦爲吐。脈緊而滑者吐逆。緊而濇者難
治。寸口脈數者吐。脈弱而嘔。小便復利。身有微熱。見厥者死。嘔吐
大痛。色如青菜汁者死。中焦噦逆其聲短。是水穀之病。爲胃火。
易治。下焦噦逆其聲長。是虛邪之病。爲陰火。難治。低聲頻密相連。
爲實。易治。半响噦一聲。爲虛。難治。暴病發噦。必痰食血。或怒氣所

干易治久病發噦者多難治

附方

左金丸 見一卷火

戊己湯 見本卷飲食

吳茱萸湯 吳萸 人參 薑 棗

香砂六君湯 六君子加 木香 砂仁

旋覆代赭湯 人參 甘草 旋覆花 代赭石 半夏 薑

二陳湯 見一卷中風

理中湯 見一卷溼

真武湯 見二卷喘

平肝 平肝 胃寒 行滯 鎮逆 除痰 扶陽 祛寒

消痞 液虛 行水 化痰 伏痰 虻虻 厥 伏 止嘔 暴吐 嘔吐

生薑瀉心湯 見本卷飲食

大半夏湯 半夏 人參 白蜜

小半夏湯 半夏 薑

溫膽湯 見一卷溫

理中安虻湯 參三錢 木 苓 薑各一錢半 川椒炒十

烏梅丸 烏梅 細辛 附子 桂枝 人參 黃蘗 當歸

安胃丸 烏梅 川椒 黃連 川附 桂枝 乾薑 黃蘗 黃連

半夏瀉心湯 見一卷溫

生薑橘皮湯 橘皮 薑

橘皮半夏湯 橘皮 半夏 薑

暴吐

枳桔湯 枳 桔 陳 樸 木香

反胃

金花丸 生南星 生半夏各一兩 天麻五錢 雄黃二錢
白麴三兩 滴水為丸 薑湯下

積去

紫沈丸 杏 蔻 陳 夏 砂仁 烏梅 丁香 檳榔
沈香 木香 巴霜 醋糊丸

閉通

半夏生薑大黃湯 夏 薑 大黃

世飲

猪苓散 猪苓 赤苓 白朮

吐厥

橘皮湯 橘皮 生薑

散逆

橘皮竹茹湯 橘皮 竹茹 加薑汁 人參 甘草 大棗

寒逐

半夏乾薑湯 半夏 乾薑 漿水煎

溫胃

紅豆丸 丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二十一粒 薑汁糊
丸 以大棗一枚去核填入一九煨熟嚼之

脾

歸脾湯 見二卷勞瘵

漏氣走人參湯 麥冬湯 麥冬 玉竹 陳參 陳米 薑 陳 苓 竹茹 甘草 蘆根

人參湯 人參 黃芩 知母 玉竹 蘆根 竹茹 白朮

靈砂丹 見二卷喘

養正丹 硝石 硫黃各一兩研末入磁器內微火炒再研次

二兩 醋糊丸豆大每服三十丸空心米飲下

一名來復丹 又名黑錫丹 砂仁 藿香 神麴 陳米

比和飲 四君湯加 陳皮 棗 丁香 藿香各二錢五分

藿香安胃散 橘皮 人參

竹葉石膏湯 見一卷傷風

二朮二陳湯 見二卷痰飲

溫胃飲 見一卷中風

脾和

嘔吐

叔 深秋吸受穢邪嘔吐不已先服藿香正氣散入口卽吐身熱足厥面黑眶陷或進導痰溫胃飲嘔惡不納診之脈虛少神予謂此中宮虛極也速用潞參山藥茯苓炙草白朮橘白蘇子蓮子紅棗煨薑粳米煎稍稍與服竟不吐思食粥矣後加減數味調理而康

李姬由腰痛續得寒熱嘔吐汗出畏冷寸關脈伏兩尺動數思高年水穀不入嘔多胃氣先傷况寸關脈不見陽氣已虛足必時厥宜其汗出而畏冷也自述脛寒至膝乃用煨薑汁熱服嘔定卽與粥湯右脈畧起因與吳茱萸湯脈症悉平

族某胸痛食減吐酸由肝逆濁泛用吳茱萸厚樸枳壳青皮半夏
茯苓爲末空心日再服金橘皮泡湯下效

夏氏兩寸洪大雨關弦滑嘔逆耳鳴口乾頭暈白帶連綿症屬肝
胃不和吳萸黃連汁炒生白芍山梔半夏青鹽炒茯苓蘇子枳壳薑霜

三服症平

李 脈洪大搏指口乾煩欬食後吐水頭目震眩而心悸此勞力
傷陽陽化內風上冒清道風翔則水湧胃虛則木乘故嘔眩不
已其水停膈間心必悸津不上朝口必乾氣不下降便乃秘治
先和陽降逆山梔甘菊炒冬桑葉茯苓杏仁蘇子俱炒牡蠣煨
海浮石淡竹茹前胡三服症平脈較斂其神倦者火風逆勢已

折也減甘菊桑葉加白芍茯神桔萸半夏潞參和肝胃以清滌
痰火遂愈

旌女情志怫悒頭眩頰赤夏初食入卽吐脈虛小經期錯亂由肝
膽火風侮胃不及傳變傾翻甚速且胃虛作呃六氣乘土久則
衝脈失涵絡傷內溢以衝爲血海隸在陽明也先在苦以降逆
山梔羚羊角竹茹旋覆花半夏麴柿蒂三四服眩吐止去羚羊
角半夏麴加阿膠另化丹皮白芍茯苓甘草調養肝胃而經期
順

噎膈反胃論治

陽結陰涸。上下格拒。而噎膈反胃之症成。人身上下七門。自飛門至魄門

咽為吸門。

即會厭氣喉上拚飲食者

胃上口為賁門。胃下口為幽門。幽門上衝。

吸門其吸氣不得。下歸肝腎為陰火格拒。故噎膈不通。甚則反胃。

分言之。則噎者咽下梗塞。水飲可行。食物難入。由痰氣之阻於上。

也。膈者胃脘窄隘。食下拒痛。由血液之槁於中也。反胃者食入反。

出完穀不化。由胃陽之衰於下也。而昔人通謂之膈。黃帝鍼經云胃病者膈咽

不通。飲食不下。丹溪云。血耗胃槁。槁在賁門。脘痛吐食。上焦膈也。

食下良久復出。槁在幽門。中焦膈也。朝食暮吐。暮食朝吐。槁在關

門。下焦經云。三陽結謂之膈。以手太陽小腸主液。足太陽膀胱主

津。三陽土材指大小腸膀胱。金鑑指二腑熱結則津液枯燥。前後

胃大小腸此據內經王註汪註。

秘。清。下。關。既。肩。勢。必。上。湧。故。食。噎。不。下。即。下。而。仍。出。是。火。上。行。而。不。下。降。矣。王。太。僕。亦。云。食。不。得。入。是。有。火。也。食。入。反。出。是。無。火。也。噎。膈。初。起。多。因。憂。悲。悵。悵。以。致。陽。結。於。上。陰。澗。於。下。醫。鑑。云。五。噎。也。飲。食。猝。阻。不。能。下。五。膈。憂。悲。寒。食。氣。也。心。脾。之。治。宜。調。心。脾。以。問。上。下。不。通。或。結。咽。喉。時。覺。妨。礙。吐。不。出。噎。不。下。治。宜。調。心。脾。以。舒。結。氣。去。桂。再。加。歸。芍。香。附。填。精。血。以。滋。枯。燥。九。猪。脂。反。胃。初。起。多。因。土。弱。火。衰。以。致。朝。食。暮。吐。暮。食。朝。吐。治。宜。扶。胃。土。以。通。陽。散。功。益。智。丁。香。乾。益。命。火。以。蒸。化。八。味。其。立。法。要。使。辛。滑。通。痞。滯。貝。母。真。砂。仁。梗。米。杏。仁。枯。蕒。批。杷。葉。韭。白。汁。而。腕。痺。以。開。甘。酸。化。陰。人。參。天。冬。麥。冬。蔗。汁。而。液。枯。以。潤。或。健。脾。理。痰。二。四。君。六。君。湯。或。不。偏。任。溫。燥。以。劫。液。或。滋。陰。養。血。生。地。阿。膠。牛。乳。梨。汁。不。偏。用。清。潤。以。助。痰。氣。滯。成。噎。者。宜。理。氣。芝。蔴。柿。霜。或。四。物。湯。

隧。九香蟲。丁香皮。鬱金。檀香。血瘀成膈者。兼通血絡。桃仁紅花延

石見穿。枳壳。廣皮。廣木香。胡當歸鬚雞

血藤膏。土材治血膈。用人參。五靈脂。歸尾。因胃陽虛而濁痰反

桃仁。鬱金。雲岐人參散。用冰麻。亦同此法也。胃者用通補胃腑。辛熱洩濁法。參苓吳萸乾薑益智。因氣鬱痰阻。

用苦降辛通法。黃連杏仁橘紅薑。因肝鬱氣逆。用兩通厥陰陽明。

法。當歸白芍香附半夏茯苓。因酒熱鬱傷肺胃。用輕劑清降。枇杷葉

金。括。藎。前。及苦辛開肺法。桔梗貝母杏仁薤其由憂思傷脾。氣鬱

胡。桑。白。皮。及苦辛開肺法。仁生薤橘紅山梔。其由憂思傷脾。氣鬱

生涎飲可下食難入。香砂寬中丸。由七情鬱結胸脘拒痛。脈必沈

滴。七氣湯。加鬱金。山痰飲阻滯嘔吐。翻胃。脈必結滯。先以來復丹

大。半。夏。湯。加。茯苓。由痰血積滯。傳化不變。反上行者。脈必乳滯。控其痰再用

九。加。至脾氣敗。血液耗。胃脘枯槁。溺少便秘。補氣健脾丸。或韭汁牛

乳飲若口吐白沫。糞如羊屎。不可治矣。勉用薑汁杏酪白蜜醫學心

悟云開關用啟膈散最效。又如五汁飲以清燥利膈。九以通壅。汞硫散以

止吐。總忌香燥破氣。辛熱耗液。惟一種胃陽衰不能運化者。暫用

辛溫開結。繼仍以益陰養胃為宜。粳米人參山藥蓮棗牛乳小麥膈症生蟲。用河

黃有梅核。膈吐不出。嚥不下。咽喉妨礙。由氣鬱痰結。九痰由死血

散。昆布當歸桃有翻胃。食入即翻出。或痰或熱壅阻膈間。非如反胃

之早食晚吐。晚食朝吐也。清熱二陳湯

再論噎由氣結。膈由痰與氣逆。或血瘀。一種氣噎。臨食輟箸。噎阻

沫升氣平。食入病在上焦。肺胃間治以輕揚利膈。苦降則過病所

一種痛膈。食下格拒。嘔涎餒痛。而饑饉中焚病在中焦。治以辛香

通降不效。必兼理血絡。一種胃槁。脘系窄隘。卽勺飲亦妨礙。由衰
年血液漸枯。胃管局閉。飲入則涎升。淚出二便俱少。開合都廢。治
以辛滑潤養。大忌香燥耗液。剛熱劫陰。此脘血失榮。下咽易梗。一
切礙滯閉氣食品。咸宜禁忌。嘗見食冷山芋而成噎者。食雞子而
哽咽成膈者。若再憂思鬱怒。結於中而莫解。情志之病尤難。霍然
徐靈胎謂噎膈症。十死八九。反胃症。十愈八九。再論反胃。由食久
不化腐濁上攻。徹底翻瀾。二腸失司。傳送病在幽門以下。古法多
謂胃中無陽。精微不能蒸化。然經云。諸嘔吐逆。皆屬於熱。且胃津
先奪。熱燥難投。必細參脈症。或苦降辛通。宣行壅滯。曾記一壯年
反胃吐食。服八味湯。暫止復吐。食羊血得愈。又沈姓年高嗜飲。兼

情悒不遂吐沫拒食半載未愈一老醫投藥四劑病勢減半再用
十劑料浸酒服而全愈方用大生地錢五海浮石一兩烏藥錢半牛膝錢靈
慈石雲苓歸身各三錢玩此方兼溫清鎮泄升降氣血性味不偏傳
者目睹治驗因附記備參

病愈後禁忌

凡噎膈反胃得藥而愈者不可便與粥飯惟以真人參錢五陳皮錢二
老黃米一兩作湯細啜旬日後方可食粥倉廩未固便進米穀常致
不救又一年之內切忌房慾犯之必舊症復發而死

噎膈反胃脈候

緊而滑者吐逆小弱而濇者反胃噎膈反胃脈浮緩者生沈濇者

死沈瀆而小爲血不足。大而弱爲氣不足。

附方

歸脾湯

見二卷勞瘵

養心湯

見二卷勞瘵

猪脂丸

杏仁 松子仁 白蜜 樹餅各四兩 猪脂熬淨

異功散

四君加陳皮

八味丸

見一卷中風

四君子湯

參 苓 朮 草 加陳 夏 名六君子

二陳湯

陳 夏 苓 草

四物湯

地 芍 歸 芎

調脾養心潤燥和胃益火健脾消痰補血

酒 膈 寬 膈 開 鬱 控 涎 反 胃 血 枯 脾 虛 通 潤 開 關

雲歧人參散

人參一兩煎成
好飲熱酒膈痛血瘀胃口

冰片各五厘治

香砂寬中丸

芩 朮 陳 夏 樸 草
香附 青皮 檳榔

木香 砂仁 薑 蜜丸

七氣湯

見二卷欬嗽

來復丹

見本卷嘔吐

大半夏湯

參 夏 蜜

滋血潤腸丸

地 芍 歸 芎 苳 汁冲服

紅花 桃仁 枳壳 大黃

補氣健脾丸

參 芩 朮 陳 夏 草 砂仁 薑 棗

韭汁牛乳飲

見一卷燥

啟膈散

沙參 丹參各三錢 茯苓一錢 川貝錢半 薑 金五分 砂仁壳四分 荷葉蒂兩枚 杵頭糠五

分 水煎 虛加人參

吐蟲化痰痰熱理氣降痰滑潤通補止吐反胃通治

河間雄黃散

雄黃分

瓜蒂

赤小豆各一錢

為末每服五

錢

滌痰丸

南星

半夏

枳壳

橘紅

菖蒲

人參

茯苓

清熱二陳湯

二陳湯

加

人參

白朮

山梔

竹茹

砂

烏龍丸

九香蟲半生

半焙

一兩

車前子炒

蜜丸

陳皮各四錢

錢

枇杷葉煎

枇杷葉

橘紅各三錢

生薑五錢

錢

錢

五汁飲

蘆芽

葶藶

甘蔗

竹瀝

薑汁

溫服

又方

方

利膈丸

參歸

藿

枳

草

橘

木香

檳榔

大黃

汞硫散

硫黃

水銀

同研細如煤色

用陳酒薑汁調服

服

服

服

服

丁香煮散

丁香

三七粒

蓮肉二七粒

二味另研

生薑七

錢

錢

錢

狗寶散

用六君子加

狗寶作散調服

服

服

服

服

服

服

嘔寒吐逆外治開膈反胃通治潤補順氣潤燥

千金五噎丸

乾薑

川椒

吳茱萸

桂心

細辛

各一兩

水各二兩

陳

苓各兩半

附子

一枚

千金五膈丸

參

草各二兩

麥冬

三兩

川椒

遠志

啄木鳥膏

啄木鳥去毛和骨搗爛熬膏入麝香一錢

蜜收

雄黃二豆丸

烏梅

二十個

確砂

雄黃

各二錢

乳香

一錢

為末和烏梅肉杵丸

大七香丸

香附

麥芽

砂仁

藿香

甘草

官桂

五膈散

參

木

蔻

夏

桔

草

沈香

生薑汁煎

薑汁

白蜜

牛酥

各五兩

人參

百合

各二兩

神香散

丁香

蔻仁

膈噎膏

人參

牛乳

蔗汁

梨汁

蘆根汁

龍眼肉汁

此藥仲淳秘方也

痰豁

七聖湯

半夏二片

黃連

白朮

人參

茯苓

竹茹

生薑

噎膈

蔣 色蒼形瘦是體質本屬木火食入脘阻嘔沫經言三陽結謂之膈夫三陽皆行津液而腎實五液之主有年腎水衰三陽熱結腐濁不行勢必上犯此格拒之由香巖先生所謂陽結於上陰衰於下也通陽不用辛熱存陰勿以滋膩一則瘦人慮虛其陰一則濁沫可導而下半夏青鹽拌製竹茹薑霜熟地炭杞子炭牛膝炭茯苓薤白薑汁數服漸受粥飲兼服牛乳數月不吐

耿 年近古稀兩尺脈微右關弦遲氣噎梗食吐出涎沫氣平食入夫弦爲木旺遲爲胃寒弦遲在右胃受肝克傳化失司治在泄肝溫胃痰水自降丁香益智仁煨蘇子霜茯苓青皮砂仁薑

煨
數服痰氣兩平

陳 酒客中虛氣阻成噎必有蒸溼釀痰脈來遲弱中脘陽衰飲
糜粥亦拒得熱酒輒行明係陽微欲結法宜通陽則胸脘得展
溼痰得降而運納有權潞參茯神茯苓砂仁丁香半夏薑製廣皮
薑棗煎數服粥飲不拒矣後再加乾薑泡淡二分益智仁生研數服胸
次舒而納食

某氏因惱怒曾嘔瘀血已是肝逆今胸痛吐沫脈濇又微食入反
出火土兩衰蒸化無力乃脾腎陽衰候也然犯辛燥又虞動血
擇其辛溫通降者宜之韭子炒研蘇子沙苑子砂仁降香汁茯苓
半夏麴益智子煨研數服食進痛沫悉止

鍾氏脾胃陽衰濁飲不降食入脹痛有吐逆翻胃之虞右脈濡滑

左微弦宜洩肝濁以通腑陽厚樸

薑製五分

枳實

六分

茯苓

三錢

半夏

薑製

錢半蘇子

炒研七分

枳壳

炒

陳皮加薑此三因七氣湯加法氣降則飲

降矣再服嘔脹減大便秘得通嗣用溫脾胃兼辛通降逆半夏砂

仁韭子

炒研

益智仁

煨研

茯苓石見穿生薑數服漸納穀食矣

下

中年喪子悲惋成噎膈痛吐食此清陽不旋逆氣不降宜善

自排遣達觀隨化非藥石能愈之病貝母鬱金茯苓神製半夏枯

蕒韭白汁薑汁蘇子汁沖服痛嘔俱減

族某客冬怫悒吐食粒米不納僅進粥飲今春怯寒吐沫二便俱

少脈細濡模糊濁逆陽微肝腎不主吸氣豈容再服奠地酸膩

閱所服方竟不識辛通大旨倣兩通厥陰陽明主治爲近理蘇
子杏仁川貝益智橘白潞參茯苓製半夏薑汁韭白汁沖服數劑
涎沫少粥飲多進間進牛乳亦不吐用香粳米炒黃九香蟲煎湯
煨藥更適轉方用大半夏湯穀食安而大便漸通

翻胃

某長夏吐食症屬胃翻服四君異功加炮薑桂附不應予謂五臟以守爲補六腑以通爲補此不易之經訓四君異功本脾藥非胃藥胃腑宜通則和一與守中必致壅逆白水炮薑皆守劑且陽土喜柔涼忌剛燥劫液久吐則胃陰傷須辛通使胃氣下行則效韭子炒研杏仁豆蔻衣半夏砂仁太子參薑汁粉桔萸仁服頗適戒毋穀食暫用麴食蓋穀性陰而滯麴性陽而通加意調養可痊

畢嗜飲翻胃麴食頗安穀食則越宿傾吐無餘此胃陽衰酒食化痰痰濁不降故也用通陽泄濁法製半夏茯苓益智仁乾薑

陳皮吳萸砂仁惜不能戒酒故時發時愈云

關格論治

下不得出爲關。二便俱閉也。上不得入爲格。水漿吐逆也。下關上格。中焦氣不升降。乃陰陽離絕之危候。景岳以此爲陽亢陰竭。元海無根。症見粒米不能下咽。渴飲茶湯少頃卽吐。復飲復吐。熱藥入口隨出。冷藥過時亦出。大小便俱阻。關無出之由。格無入之理。急症難從緩治。內經以陰氣太盛則陽不能榮。故曰關。陽氣太盛則陰弗能榮。故曰格。陰陽俱盛。不得相榮。故曰關格。關格者。不得盡期而死。因是症氣逆於上。津涸於下。與噎膈反胃同而勢較驟。最忌燥熱。劫陰法宜甘潤滋液。生脈散加甜杏仁、玉竹等。或甘酸化陰。參、麥、阿膠、地黃。白芍、烏梅、牛膝等。如脈洪大者先降火。山梔、犀角、竹茹、黃連等。沈滑者先豁痰。大半夏湯。

兼虛弦者先和陰。甘露飲去。喘滿者先降逆。降氣湯。陽結者先通。

痞。用半夏瀉。液虛者主通潤。一陰。真陰素虧者滋化源。大營。氣血。

兩不足者填虛損。大補。膏治一老人吐欲死便不通上格下關。用。

苓。歸。芍。山。藥。牛。吐。止。用炒梗米湯。調理便通獲愈。可以審所治矣。

參。冬。百。合。等。濃。煨。三。陰。煎。

關格脈候

經言寸口主中。人迎主外。兩者相應俱往俱來。若引繩大小齊等。

春夏人迎微大。秋冬寸口微大。如是者為平人。寸口即太陰氣口。

六腑之陽氣口。若人迎盛至四倍且大且數。名溢陽為外格。此孤。

察五臟之陰。存水不濟火。寸口盛至四倍且大且數。名溢陰為內關。此元陰失。

陰。陽為格也。寸口盛至四倍且大且數。名溢陰為內關。此元陰失。故陰中無陽。

陰氣不升故陽中無陰陰陽相離死不治。越人以上魚為溢為外關內格入尺為覆為內關外格及仲景東垣等以在尺為關在寸為格皆與經背

附方

生脈散 見一卷暑

大半夏湯 參 夏 白蜜

甘露飲 見二卷衄血

降氣湯 見二卷失音

半夏瀉心湯 見一卷溫

一陰煎 見二卷咳嗽

大營煎 熟地三錢 當歸 杞子 杜仲各二錢 牛膝錢
半 肉桂 炙草各一錢

理調虛填

大補元煎
見二卷汗

三陰煎

人參 地三錢

山藥 黃肉

當歸 炙草各一錢

杞子 杜仲各二錢

熟地 各二錢

煎

諸氣論治

天地之氣和則診戾不作。生人之氣和則諸疾不興。其氤氲一身。

有宗氣有衛氣有元氣有中氣。宗氣積於胸中爲氣之海。衛氣行

於脈外爲營之護。元氣根於脾土。中氣出納丹田。顧經云百病皆

生於氣者。由六淫戕於外。七情戰於中。則氣之冲和者致偏。清純

者化濁。流利者反滯。順行者多逆。如寒則氣收。暑則氣泄。喜則氣

緩。怒則氣上。悲則氣消。恐則氣下。驚則氣亂。思則氣結。勞則氣耗。

清氣在下則生飧泄。濁氣在上則生脹脹甚則厥逆。噦呃痞嘔噎

膈攻注刺痛。無非氣所主病。局方治法通用辛香燥劑。然當審其

虛實新久。如氣虛宜培。

用四君補中
保元諸湯。

氣實宜泄。

用七氣五磨
降氣諸湯。

新病

脹滿宜辛通。用半夏砂仁枳殼。久抱悒鬱宜溫散。用越鞠丸去蒼

鬱金。肺氣臍鬱宜開。用桔梗枳殼杏仁。枇杷葉貝母桑白皮。虛促宜斂。補肺肝氣升

逆宜降。青皮枳殼降香。燥急宜緩。白芍甘草木瓜。膽氣鬱滯宜和。

溫膽。火熱宜泄。山梔龍胆草黃芩。胃氣結燥宜疏。蘇梗枳實藿香

疴痛宜調。烏藥香附半夏。木火乘土宜平。膽乘脾。戊己肝乘胃。白

陳皮枳殼厚樸。腑不宜通宜升降。正氣散。腎氣厥逆宜溫。吳茱

焦痞塞宜運。丁香五。六氣失調傷暑霍亂清不升濁不降。六和

情氣鬱喉間如絮咯不出。噦不下。三因七。氣痞。半夏瀉。氣結。沈香

丸。氣虛挾滯。異功散。寒挾痰。二陳湯加挾火。左金丸。龍膽瀉肝。挾

寒。烏沈。挾食。大和中飲。挾血瘀。血鬱。噫噎。代赭旋。呃逆。橘皮竹

湯。或保和丸。挾血瘀。血鬱。噫噎。覆湯。呃逆。茹湯。刺

痛。木香調。膈噎。神香散秘。傳膈噎膏。怒後脇滿。加山梔。金橘。解肝煎。去砂仁。暴怒氣厥。人

事不省。蘇台香。九灌之。婦女血氣攻衝。心腹猝痛。湯。烏沈。大約氣行則痛止。

氣調則血和。清者宜升。濁者宜降。鬱則生火。滯則挾痰。辛香暫用。開導燥熱。又易劫陰。以氣本屬陽。有餘便是火。且上升之氣。自肝而出。中挾相火。故氣病多屬肝逆。犯胃。肝陽化風。再若衝脈失鎮。丹田失納。肺腎不交。喘促交至。治氣者當從此際參之。

諸氣脈候

下手脈沈。便知是氣。其或沈滑。氣兼痰飲。沈極則伏。瀉弱難治。沈實有力。宜辛散。沈弱少力。宜溫養。弦洪有火。宜苦降。細瀉無神。宜甘緩。

補氣補氣補氣理氣溫散降氣解鬱斂補降涎

附方

四君湯 參 苓 朮 草

補中益氣湯 見一卷火

保元湯 見一卷火

三因七氣湯 見二卷欬嗽

五磨飲 檳榔 沈香 烏藥 枳實 木香 磨汁加白酒

蘇子降氣湯 見二卷失音

越鞠丸 香附 蒼朮 川芎 神薏 梔子 麴糊丸

補肺湯 參 耆 五味 紫苑各八分 熟地 桑皮各錢

溫膽湯 見一卷溫

乘脾升降溫理三焦

戊己湯 參 苓 朮 草 陳 芍

正氣散 見一卷中風

吳茱萸湯 茱萸 參 薑 棗

丁香五套丸 丁香 木香 青皮 橘紅各五錢 白朮 半夏各

二兩 湯浸 蒸餅為丸

六和湯 見一卷暑

半夏瀉心湯 見一卷溫

沈香化氣丸 大黃酒蒸 陳苓各二兩 參 朮各三兩 沈香五錢另研 前四味挫碎用薑汁 竹瀝

浸晒研末和沈香末 神麴糊丸

異功散 見一卷中風

虛滯

濕行痰氣火鬱肝火肝火清泄溫散消導消食理痰

治中湯

見本卷飲食

二陳湯

陳夏 苓草

左金丸

見一卷火

龍膽瀉肝湯

龍膽草 車前

黃芩 當歸

梔子 柴胡

甘草

澤泄

生地

木通

戊己丸

見本卷飲食

火鬱湯

連翹 栝蒌

薄荷 竹葉

黃芩

桃仁

麥冬

甘草

鬱金

烏沈湯

烏藥 錢入

沈香 薑三片

人參各一兩 煎成加鹽一字

炙草五錢

每服五

大和中飲

見本卷飲食

係和丸

見二卷痰飲

血鬱湯

丹皮 韭汁

紅麴 甲片

紅花

降香

蘇木

山查

桃仁

嘔氣呃忒止痛噎膈噎膈怒傷氣厥

代赭旋覆湯 代赭 旋覆

橘皮竹茹湯 見本卷嘔吐

木香調氣散 見一卷中風

神香散 丁香 蔻仁

膈噎膏 見本卷噎膈

解肝煎 陳夏 苓 樸各錢半 蘇葉 白芍各一錢

蘇合香丸 見一卷中風

[illegible]

諸氣

本 頭眩口苦膽氣泄也脇痛入脘肝氣逆也便不通爽膽氣結也清膽熱降肝逆以和膽氣用嫩桑葉粉丹皮生薑仁以瀉少陽枳壳金橘皮降香末以治厥陰蘇梗郁李仁穀芽以和陽明白芍木瓜緩中瀉木爲統治服效

張氏氣攻胸脘脹痛身熱口乾便秘寸脈浮長關小數此肺脾鬱久化熱致津液不行故便燥而艱也用苦降法枇杷葉鬱金汁枳壳杏仁百合麥冬葭霜郁李仁生蜜沖入數服而平

陳氏氣阻胸膈引背食入脹痛臍上瘕聚有形脈來虛緩胃逆不降少納五旬餘得此懼延中膈宜緩攻姑與辛通製半夏杏仁

陳皮草薤煨研枳壳砂仁壳淡薑渣延胡酒炒韭白搗汁冲四服而

病若失

龔氏食入脘脹微渴便苦燥腑氣阻津液不行胃病治肝誤用牡蠣赭石斂鎮兼烏藥香附辛溫痞聚更增下壅益甚脉沈而駛藥忌溫滯劫液阻隧主辛滑通潤於腑病爲宜當歸杏仁郁李仁龔仁俱研橘白蘇梗枳壳淡芙蓉韭白汁冲數服愈

本久嗽氣促中夜必起坐是亥子陽升丹田不納今長夏每食必臍下氣衝涌吐無餘更由勞動陰火擾胃劫痰直上冲咽先予降逆蘇子橘紅枳壳枯蕒杏仁降香貝母一吸吐止議鎮衝脉青鉛坎炁牛膝山藥五味熟地炭茯神三服氣定嗽滅

張

運息強通督任致動衝氣從陰股內廉入陰囊抵關元直上
挾臍升至中脘氣卽停泊偏繞右膈冲咽欲呃此震傷衝任經
氣由丹田交會入脘作呃靈樞亦謂衝任並起胞中爲經絡之
海其浮而外者循腹右上行會於咽喉也此氣升逆神不自持
恍惚無寐自汗神煩身左虛墮良由精血失涵任乏擔承衝慣
升逆不嘔不服無關臟腑一切補臟通腑奚出入絡擬鎮養奇
經診脉左右動數仍防喘熱耳牛膝黃肉俱酒炒炭當歸鬚酒拌各一錢
熟地炭龜甲心炙杞子焙各二錢扶神降香末各三錢桂心三分隔水煨冲

[illegible]

肝氣肝火肝風論治

凡上升之氣自肝而出。肝木性升散。不受遏鬱。鬱則經氣逆。爲噎。爲脹。爲嘔吐。爲暴怒。脇痛。爲胸滿。不食。爲飧泄。爲瘕疝。皆肝氣橫。決也。且相火附木。木鬱則化火。爲吞酸。脇痛。爲狂。爲痿。爲厥。爲痞。爲呃噎。爲失血。皆肝火衝激也。風依於木。木鬱則化風。爲眩。爲暈。爲舌麻。爲耳鳴。爲瘕。爲痺。爲類中。皆肝風震動也。故諸病多自肝來。以其犯中宮之土。剛性難馴。挾風火之威。頂巔易到。藥不可以剛燥投也。經曰。肝苦急。急食甘以緩之。肝欲散。急食辛以散之。用辛補之。酸瀉之。古聖治肝法。盡於此。夫肝主藏血。血燥則肝急。凡肝陰不足。必得腎水以滋之。血液以濡之。味取甘涼。或主辛潤。務

遂其條暢之性則鬱者舒矣凡肝陽有餘必需介屬以潛之柔靜以攝之味取酸收或佐酸降務清其營絡之熱則升者伏矣治肝

氣先疏其鬱宜道遙散因怒動肝小柴胡湯加山梔青皮噯而吐沫代赭旋覆湯嘔而

脹滿三因七氣湯加枳殼木香怒傷脇痛生白芍金橘皮山梔枳殼鬱金汁降香末腸鳴飧泄則泄

不安土人參安胃散加半夏麴瘰癧腫硬則導滯和肝橘核丸加減若氣有餘便

是火治肝火實吞酸脇痛左金丸抑青丸脇大痛引腰背汗泄忌辛燥耗

氣劫液宜甘酸化陰甘草柏子仁杞子棗仁阿膠牡蠣木瓜生白芍五味子鱉甲金橘皮虛痛久痛

必入絡宜理營絡旋覆花湯加當歸髮丹皮延胡桃仁溼熱火盛脇痛筋痿漫血龍膽

薄肝湯火盛狂躁胸痞咽阻便秘當歸龍薈丸陰虛痿弱虎潛丸厥逆四逆

散痞滿半夏瀉呃噎橘皮竹吐衄失血犀角地黃湯至於肝陽化

風上擾清竅。則巔痛頭暈。目眩耳鳴。心悸寤煩。由營液內虛。水不涵木。火動痰升。其實無風。可散宜滋液和陽。復脈湯去薑桂。或用熟地。白芍。杞子。茯神。
棗仁。炒甘。菽霜。桑。其由腎虛陽浮者。宜填髓補精。阿膠。龜甲。淡菜。葉牡蠣。石斛。五味。
熟地。其由土弱木乘者。宜緩肝益胃。酸棗仁湯。去川芎。
磁石。其由土弱木乘者。宜緩肝益胃。加入參。山藥。小麥。
致舌麻肢痺筋惕肉瞤。由五志過極。陽亢陰衰。風從火出。宜柔潤。
息風。河間地黃飲子。去桂。附巴戟。菖蒲。
蒲根。枯蘘鉤。其年高水虧。風火易升。頭暈便秘。宜壯水滋燥。
藤。菊。葉。薄荷。其年高水虧。風火易升。頭暈便秘。宜壯水滋燥。
杜仲。巴戟。楮實。茴香。加桑葉。黑。其陽明絡虛。風火易震。食少知飢。
芝。蔴。柏子仁。炒甘。菽。茯神。牡蠣。其陽明絡虛。風火易震。食少知飢。
宜填實空際。人參。山藥。炙草。牡蠣。
不宜剛而宜柔。不宜伐而宜和。正倣內經治肝之旨也。
大抵肝為剛臟。職司疏泄。用藥。

丹溪曰病人自言冷氣從下而上非真冷也此上升之氣自肝而出中挾相火自下而上其熱為甚自覺冷者火極似水積熱之甚也陽亢陰微故見此症又曰氣從左邊起肝火也宜左金丸氣從臍下起陰火也黃蘗丸氣從足下起入腹虛之極也滋陰降火湯外用附子末塗湧泉引熱下行

附方

逍遙散 見一卷火

小柴胡湯 見一卷溫

代赭旋覆湯 見本卷嘔吐

二因七氣湯 見二卷欬嗽

疏鬱因怒變氣嘔脹

瀉痢癰疽肝火脇痛理絡火盛火狂痿弱陽厥胸痞

人參安胃散

參一錢 芍七分

蒼二錢 茯苓四分

生草 炙草各五分

陳皮三分 黃連二分

白

橘核丸

橘核 延胡

川棟 厚樸

海帶 枳實

海藻 木通

昆布 桂心

桃仁各二兩

木香各五錢

左金丸

見一卷火

抑青丸

黃連一味以茱萸湯浸一宿為丸

旋覆花湯

見二卷痰飲

龍膽瀉肝湯

見本卷諸氣

當歸龍薈丸

見一卷火

虎潛丸

見一卷中風

四逆散

柴胡

白芍

枳實

炙草

半夏瀉心湯

見一卷溫

呃逆吐衄滋液益胃類中老人陰火陰火滋火

橘皮竹茹湯

見本卷嘔吐

犀角地黄湯

見一卷溫

復脉湯

見一卷中風

酸棗仁湯

見一卷中風

地黃飲子

見一卷中風

還少丹

見一卷中風

黃蘗丸

黃蘗一味酒炒水丸

坎離丸

見一卷火

滋陰降火湯

白芍一錢三分

當歸一錢二分

熟地

麥

炙草各五分

白朮各一錢

生地八分

知母

黃蘗

加薑

棗

水煎

肝氣

本

脇左隱痛胸間動氣頭眩肢麻寐卽舌乾似辣中夜自汗清
晨欬痰便瀉覺爽肝陽挾風火上冒侵犯脾土使然秋深左關
脉弦長牢實醫謂金弱木強非時脉見來春木必侮土膈逆可
憂遂用滋腎鎮肝數十劑脉症未退更醫進胃愛丸服後痰較
少而泄氣多且皆健脾藥不能制肝陽歷冬并右脉亦弦勁胸
脘引痛予謂前症自是肝陽肆橫但肝爲剛臟不任克制專用
滋清恐又致痛爲脹若做內經治肝以酸瀉之法自然柔伏矣
因用白芍木瓜烏梅黃肉五味金橘棗仁等加牡蠣醋煅橘絡木
香茯神芝蔴小麥桑枝膏爲丸服後左關漸軟不見弦長矣且

示以靜攝戒怒節勞右脉亦和諸症漸除

王 高年胸膈氣阻痛脉虛弦用苦鹹酸以泄降厚樸薑汁製五分枳

壳旋覆花各錢半牡蠣粉醋煨二錢白芍炒三錢木瓜八分降香末二錢三服

肝逆已平尙未嗜食用甘涼以調胃陰石斛二錢麥冬半錢甘草五分

茯苓白芍當歸各二錢小麥一握紅棗五枚五服全安

沈氏寒熱食減厥氣攻注痛連胸背脉弦左浮大服平肝鎮逆之

劑攻注稍緩宿有脹症曾用通腑法獲痊今懼其壅而成脹兼

用通鎮庶幾善後之防白雲苓二錢鬱金厚樸各六分砂仁烏藥各八分

蘇梗枳壳各錢半代赭石石決明各二錢金器同煎三五服愈

何氏肝鬱失暢循經則頭項作脹乘脾則痰濁化酸入絡則肌肉

刺痛脘下零濕經信愆期左關沈弦治在疏肝佐以滲濕厚樸
香附鬱金白芍茯苓金橘皮山梔鉤藤當歸鬚三四服諸症減
自述平昔腸鳴必傾瀉乃爽亦木氣乘土之咎且肥人慮虛其
陽前方去鬱金山梔加製半夏炒白朮薏米炙草經亦調

蔡 小腹氣上衝膈食下嘔吐寒熱便瀉滿痛病久脉弦左虛乃

厥陰瀉逆爲吐攻腸爲瀉治在泄瀉安胃吳萸酒泡川楝子酒小

茴香酒炒茯苓車前子橘核白芍俱生薑半夏麴數服諸症退去

吳萸川楝子車前子生薑加砂仁炮薑廣皮服愈

東氏經阻疑孕胸痞嘔酸寒熱脛冷食減便難兩部脉沈弦乃氣

逆瀉踞非惡阻病宜和肝洩瀉吳萸香附鹽水炒茯苓厚樸半夏

俱薑汁炒橘白蘇梗枳壳煨薑三服前症漸平

張當春脉弦肝木乘土噫氣大便艱少常欲如廁皆肝氣忽升

忽降致之青皮旋覆花降香白芍牡蠣炙草當歸半夏薑汁二製

服噫氣平大便不結惟羣九注痛加橘核酒炒服全瘳

丁神傷思慮則肉脫意傷憂愁則肢廣高年憂思菀結損動肝

脾右脇氣痛攻胸引背不能平卧氣粗液奪食少便難由肝胃

不和腑不司降耳鳴肢痺體瘦脉弦風動陽升脂肉消鑠有暈

仆之懼香巖謂肝爲剛臟忌用剛藥仲景法肝病治胃是有取

乎酸泄通降之品矣白芍木瓜牡蠣金橘皮蘇子萆仁杏仁歸

鬚枳壳再服頗適然症出情懷內起宜娛情善調不宜苛恃藥

餌也

陳 脇脹胸痛嘔吐肝氣上升陽明當其衝必犯腕傾液而出脉

左遲虛右弦小陰瘡宿恙未愈治在益胃和肝勿使瘡厥白芍

茯苓

各二錢

製厚樸

六分

製半夏

錢半

橘白枳壳

各一錢

砂仁

連壳八分

木香

三烏梅二枚

煨薑

二片

數服脹痛若失陰瘡亦瘳

於 先由吞酸漸次胸脇滿悶食後必吐病因肝鬱失暢延至木

氣犯土水濁不降勢必溺少便結肝乘胃反矣苦降逆辛洩濁

主之製厚樸吳萸乾薑蘇子

炒研各五分

枳壳降香末半夏麴

各錢半

茯苓

二錢

椒目

十粒

數服漸安

潘 少腹本厥陰部分疔痛不已利下粘膩如魚腦又嘔紫血甚

多繼以鮮紅夜煩不寐足厥冷左脉虛弦右虛小此土受木侮
必飲啖後鬱勃動肝厥陰陵犯中下焦清濁互傷嘔利并劇節
交雨水風陽猝乘藥忌剛燥但柔肝熄風緩痛爲宜阿膠水煨白
芍木香小茴香鹽水炒香附醋炒延胡酒炒茯神一服血止痛利大減
足亦和再加炮薑黑查肉服症悉平改用潞參茯苓白芍山藥
炙草砂仁訶子肉粳米棗肉調脾而食進但嘔利傷陰精神未
復因事振觸寒熱煩痛按捶畧爽是營衛流行之機未免鈍窒
矣且欬喘痰灰腎虛氣少攝納必補中則營衛自和攝腎則喘
嗽可定潞參炙耆歸身炙草茯苓神五味山藥骨脂核桃肉沙苑
子漸次調理向安

從姪左乳下一縷氣升熱痛至項明是肝陽鬱久致然恰當暑濕
炎蒸每歲屢發本由怫悒肝久失暢經隧痰氣阻塞致肺胃不
主開降痞噎吞酸大便忽澹忽鞭脉來沈潛倣丹溪越鞠丸山
梔川芎神麴香附醋炒萸仁旋覆花杏仁貝母枳壳煎服輒安

嚴 中年氣從季肋橫攻中上脘嘔沫失血年餘未愈近日食少

神衰服燕窩湯滋脹兩關虛緩冷涎上泛此肝濁痰滯久則入

絡致滿宜辛溫泄濁吳萸鹽水炒半夏薑製廣皮延胡酒焙厚樸薑製茯

苓降香末當歸鬚二服冷涎痛脹悉止但陽衰脛冷法在益陽

去吳萸加桂枝炮薑草果煨等三劑食進

吳 冬初由水瀉後腹脹是臟寒生滿脉虛食少治先溫通理陽

用益智炮薑潞參茯苓製半夏縮砂壳廣皮陳粳米煎湯服數劑頗適晚餐少運化加神麴雞內金俱炒脹寬冬季因悞逆動肝脇腹脹痛寒熱脉微數轉方用白芍當歸潞參蘇梗鮮橘葉縮砂壳鬱金汁兩和肝胃痛緩藥停春正上脘痛嘔沫由肝邪乘胃胃氣失降則脹壅肝陽上升則嘔痛因肝爲剛臟法當柔以軟之甘以緩之且肝陰久虧觸事生怒脾元不復病先肉脫劣手竟用赭石重鎮桂心剛制炒木壅氣兼蒺藜青皮疏肝伐肝一啜煩躁大痛再劑脇如刀割腹絞痛欲絕子聞擬甘潤柔劑用阿膠雞蛋黃白芍甘草棗仁當歸飴糖等遙寄片紙藥未及撮而歿誌此爲以剛治剛好言平肝者鑑

肝火

趙

左脇痛脉洪耳鳴時嘔脹腹痛皆肝火熾騰濁瘀不肯泄降

宜戒怒節飲可愈倣梔萸湯山梔

薑汁炒

黃連

吳茱萸汁炒

白芍牡蠣

生杵丹皮金橘皮服效

肝風

本

寐醒舌乾辣華池津不上朝頭眩耳鳴肢麻肋痛肝風內震

腹滿腸鳴晨瀉不爽木氣直犯中宮矣左關浮弦右浮滑痰嗽

不利太陰受戕有年須防類中晨服方運脾壽以利濕生白朮

茯苓半夏

青鹽製

炙草薏米

炒

砂仁益智仁

煨

山藥

炒

小麥晚服

方養肝陰以熄風阿膠

水化

杞子茯神麥冬石斛白芍桑枝甘菊

炒

黑芝蔴牡蠣粉寐後用柿霜

二匙

含舌下以生廉泉之津服效

沈氏當春鬱怒不寐五更起坐倏然頭搖手戰目閉耳鳴暈絕身

冷此怒動肝陽內風挾痰火上冒也急煎淡青鹽湯以降風火

一啜得醒用牡蠣鉤藤山梔桑葉白芍茯神菊花

炒

二服神志

已清轉方用熟地黃炒杞子焙石斛剉桑仁炒龜板炙牡蠣粉慈石鎮補肝陰而安

沃 煩勞傷陽陽氣化風上巔兩太陽刺痛耳鳴口乾寒熱不寐
自汗便瀉下元疲乏脉模糊治先熄風鎮陽甘菊炒荷葉慈石
牡蠣粉茯神甘杞子焙熟地炭白芍五味炒數服諸症向安惟
不嗜味微嗽加甜杏仁潞參蓮棗以補脾肺原方去前四味嗣
用丸方牡蠣粉淡菜首烏熟地杞子牛膝酒五味焙阿膠水和
煉蜜丸以滋填下元匝月而愈

鬱症論治

凡病無不起於鬱者。如氣運之乖和也。則五鬱之病生。經言木鬱達之。宣火鬱發之。升土鬱奪之。散金鬱泄之。解表利小便水鬱折之。其衝此論勝復之變。情志之怫抑也。則六鬱之病作。經言怵惕思慮則傷神。憂愁不解則傷意。悲哀動中則傷魂。喜樂無極則傷魄。盛怒不止則傷志。恐懼不解則傷精。此論氣血之損。又言嘗貴後賤。雖不中邪。病從内生。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。以及病發心脾。不得隱曲。思想無窮。所願不得。皆情志之鬱也。夫六氣外來之鬱。多傷經腑。如寒火濕熱痰食。皆可以消散解。若思憂悲驚怒恐之鬱。傷氣血。多損臟陰。可徒以消散治乎。七情內起之鬱。始而傷

氣○繼○必○及○血○終○乃○成○勞○主○治○宜○苦○辛○涼○潤○宜○通○苦○能○泄○熱○辛○能○理

通○能○解○結○用○劑○必○氣○以○鬱○為○燥○邪○必○肺○氣○失○宜○不○能○升○降○中○氣○日

味○相○投○乃○可○取○效○結○不○能○運○納○至○血○液○日○涸○肌○消○骨○蒸○經○閉○失○調○乳○巖○項○癭○而○鬱○勞

之○症○成○不○止○血○嗽○氣○膈○狂○癲○失○志○而○已○今○分○條○列○治○如○思○鬱○傷○脾

氣○結○宜○薤○金○貝○母○當○歸○柏○思○鬱○傷○神○精○滑○神○傷○心○不○攝○腎○故○遺○思○

鬱○傷○肝○潮○熱○逍○遙○思○鬱○傷○心○脾○失○血○歸○脾○湯○去○白○憂○鬱○傷○肺○氣○阻○

杏○仁○栝○蒞○皮○鬱○金○枳○殼○憂○鬱○傷○中○食○少○七○福○飲○去○熟○悲○鬱○藏○燥○欲○

枇○杷○葉○竹○瀝○薑○汁○半○夏○人○參○棗○仁○茯○神○龍○骨○驚○鬱○神○亂○欲○狂○清○

泣○甘○麥○大○驚○鬱○脂○怯○欲○迷○石○菖○蒲○南○棗○小○麥○驚○鬱○神○亂○欲○狂○清○

溫○膽○怒○鬱○肝○傷○氣○逆○解○肝○怒○鬱○火○升○動○血○化○肝○恐○鬱○陽○消○精○怯○味○人○

九○加○減○或○鹿○諸○鬱○久○風○陽○內○生○眩○悸○咽○痛○宜○阿○膠○生○地○石○斛○茯○神○

角○膠○酒○化○服○牡○蠣○白○芍○麥○冬○甘○草○

氣鬱脉沈而瀄。七氣血鬱脉瀄而乳。四物化氣鬱生涎心悸。溫膽湯。

血鬱絡傷脇痛。金鈴子散加桃仁。肺脾鬱營損肌瘦。養營湯去桂。

心脾鬱怔忡崩漏。歸脾肝膽鬱血燥結核加味道遙散。若脾胃鬱。

氣噎噦呃。金匱麥門冬湯。三焦鬱口乾不食。梔子仁薑汁浸炒黑。

梅煎。若夫六氣之火鬱散之湯。火鬱寒鬱成熱瀉之。羚羊角山梔生。

湯服。連川濕鬱除之。除濕湯痰鬱滌之。潤下丸或二陳湯加。食鬱消之。

石斛。保和通治諸鬱。用鬱鞠丸六陰陽壅滯氣不升降。沈香降。婦人咽。

丸。中如有炙鬱咯不出咽不下。半夏厚。凡懷抱不舒遭遇不遂以及。

怨曠積想在心。莫能排解種種鬱悵。各推其原以治之。然以情病。

者。當以理遣。以命安。若不能怡情放懷。至積鬱成勞。草木無能為。

挽矣。豈可藉合歡損忿萱草忘憂也哉。

丹溪立鬱鞠丸以治六鬱。

用香附理氣。川芎調血。蒼朮去濕。山梔泄火。神麴療食。有痰加貝母。開鬱

利氣爲主。謂氣鬱則濕鬱。濕鬱則熱鬱。熱鬱則痰鬱。痰鬱則血鬱。

血鬱則食鬱。相因爲病。趙養葵云。東方生木。火氣附焉。木鬱則土

鬱。土鬱則金鬱。金鬱則水鬱。五行相因之理。與以逍遙治木鬱諸

鬱皆因而愈。甚者方中加佐以黃連治心火。吳茱萸氣躁肝之氣亦躁。

同氣相求。而佐金以制木。此佐金之所以得名也。繼用六味丸加

以滋水生木。木火鬱舒。土亦滋潤。金水相生矣。

鬱症脉候

鬱脉多沈伏。或結促。或沈瀟。鬱在肝腎見於左。鬱在心脾見於右。

氣血食積痰飲。一有留滯。脉必止。瀉但須有神。有神有胃氣也。鬱
脉雖沈伏結促。有氣可散。氣通則和。若牢革弦強不和。正氣先傷。
無氣可散。即調補難效。况誤行耗氣藥乎。所以鬱症得弦強脉者。
多成虛損。醫通

附方

越鞠丸 見本卷諸氣

通治諸鬱

六鬱湯 香附二錢 橘紅 蒼朮 撫芎 半夏各一錢
赤苓 山梔各七分 炙草 砂仁各五分 薑三

片 氣加木香烏藥紫蘇砂仁 濕加薏苡白朮 熱加黃
芩倍山梔 痰加南星枳壳 血加紅花丹皮 食加山查

神麴 麥芽

精滑 固陰煎 見二卷脫

潮熱失血少悲鬱驚狂 怒鬱傷肝恐鬱氣鬱

逍遙散 見一卷火

歸脾湯 見二卷勞瘵

七福飲 參地各三錢 當歸 棗仁各二錢 白朮錢半 炙草 遠志各五分

甘麥大棗湯 甘草 小麥 大棗

清心溫膽湯 陳夏 苓 草 竹茹 枳實 蘆 芎 黃連 麥冬 遠志 菖蒲

附香

解肝煎 見本卷諸氣

化肝煎 見二卷血

八味丸 見一卷中風

七氣湯 見二卷咳嗽

血鬱 氣鬱 絡傷 營損 吞酸 胃鬱 散火 濕鬱 痰鬱

四物化鬱湯

地芍青黛

歸

芍

桃仁

紅花

香附

溫膽湯

見一卷溫

金鈴子散

金鈴子

延胡索各一兩

每服三錢

酒調下

人參養營湯

見二卷勞瘵

左金丸

黃連 吳萸

金匱麥冬湯

見一卷燥

火鬱湯

見一卷火

除濕湯

茅朮四錢 防風二錢 茯苓 白朮 白芍各一錢 薑 棗

平胃散

見一卷濕

潤下丸

芩 連 星 草各一兩 半夏二兩 橘紅八兩 用鹽五錢水化浸橘紅煮乾焙共研蒸餅爲丸

消痰 食鬱 氣滯 婦鬱 治木 治火 治火 治濕 治土 治痰

二陳湯 陳夏 苓 草 薑

保和丸 見二卷痰飲

沈香降氣散 沈香二錢八分 砂仁七錢半 香附六兩二錢半 炙草五錢半 每服二錢 薑湯下

半夏厚樸湯 即七氣湯

達鬱湯 升麻 柴胡 川芎 香附 桑皮 橘葉 蒺藜

火鬱湯 見本卷諸氣

發鬱湯 見一卷火

濕鬱湯 木 樸 苓 夏 芎 羌 獨 草 蒼 朮 香

奪鬱湯 藿香 蒼朮 香附 陳皮 砂仁 草果 蘇梗

痰鬱湯 杏 薤 枳 陳 苓 草 香附 浮石 蘇子

治金治食治水治血

泄鬱湯

紫苑

貝母

桔梗

沙參

香附

砂仁

白蒺

食鬱湯

神麴

枳壳

香附

砂仁

梔

樸

芎陳

折鬱湯

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

肉桂

丁香

木通

血鬱湯

見本卷諸氣

有金治食治水治血

鬱

湯

卷之四

四

鬱

本 謀慮不遂膽鬱生火春季目眶紅暈驚悸口渴渴黃見聞錯
妄脉洪疾用龍膽瀉肝湯去苓柴通澤加丹皮白芍赤苓生棗
仁二服已定再用平調之劑而安

劉 年高胸悶氣從下焦逆上飢不思食此必鬱怒致病右關脉
浮長過本位兩尺搏大顯然氣逆不降少陽司令得此有膈噎
吐沫之憂鬱金栝蒌皮前胡枳壳蘇子青皮降香末郁李仁數
服效

睦氏食後脘痞嘔酸口燥鼻衄經四月乃行沈綿十載由氣分延
及血分乃肝鬱不舒致濁升血逆有終身絕孕之累生香附吳

莫

黃連
汁炒

黑山梔茯苓蘇子鬱金澤蘭數服痞嘔漸減去香附吳

莫加丹皮白芍當歸延胡

俱酒
炒

椒目數服經行再加金橘皮木

香汁加減前藥爲丸漸平

王氏病久懷抱悒鬱脉細滴少神左尤甚嘔酸食脹胃陽不舒左
耳項痛連髮際虛陽上攻膽氣橫溢木鬱土衰必至便秘經阻
用吳茱萸湯去薑棗加製半夏橘白茯苓枳壳甘菊鉤藤嫩桑
葉三服甚適去吳莫加穀芽益智當歸又數服諸症漸除

謝氏右腋氣痛益大經先期至則渾身牽痛結襦十載從未孕育
頭暈帶下食後吐酸脉沈弦症由鬱久傷肝肝經氣逆致生風
火動血震絡腑氣失降嘔眩濁逆營衛失調脉隧阻痺治用兩

通厥陰陽明法黃連山梔

俱薑汁炒

香附

童便製

枳壳鬱金茯苓當歸

貝母橘絡絲瓜絡數服症減改用加味道遙散去柴胡白朮加

貝母鬱金汁合膠艾湯數服而經漸調

鄒氏因喪女哀悵漸次腸痞食入脹加痰濁不降嘔苦便澹脉虛

遲此悲愁鬱損生陽致氣窒濁壅治在泄肝溫胃倣吳茱萸湯

吳茱萸乾薑

各五分

製半夏茯苓

各二錢

枳壳砂仁壳橘白烏藥

各八分

三服嘔止脹寬食進改用通腑利濕大腹皮

洗淨二錢

厚樸

五分半夏

麴椒目

十五粒

茯苓砂仁壳

八分

煨薑

錢半數服而安

呃逆論治

呃逆症氣逆於下。直衝於上。作呃忒聲。由肺胃氣不主降。肝腎氣不主吸。故也。內經謂之噦。內經治噦之法。以草刺鼻。嚏而已。無今謂之呃。其症因寒。火。痰。食。以及傷寒。吐利。病後。產後。多有之。舉其綱。則寒呃。熱呃。虛脫呃。三者括之而已。寒呃宜溫。宜散。寒去而氣自舒。熱呃宜降。宜清。火靜而氣自平。古方用柿蒂。取其苦溫降逆。散痰。乃從。虛脫呃。則非大補真元。必難鎮攝也。其寒滯爲呃者。陰治之法。丁香散。二陳湯。其肺痺爲呃者。咽阻胸悶。枇杷葉。川貝母。凝濁逆。丁香皮。乾薑湯。其胃火爲呃者。脉實便堅。安胃。其胃虛爲呃者。虛陽上逆。皮橘仁。淡。其胃火爲呃者。脉實便堅。飲。其胃虛爲呃者。虛陽上逆。皮橘豆豉。其胃火爲呃者。脉實便堅。飲。其胃虛爲呃者。虛陽上逆。皮橘竹茹湯。旋其怒動肝火者。脇痛吐酸。佐金湯。加白芍。山梔。金器。其覆代赭湯。其怒動肝火者。脇痛吐酸。金器取鎮逆以平肝。其

氣逆作呃者肝邪乘胃旋覆代赭湯加降香其痰滯爲呃者飲停氣阻丁香

湯其食滯爲呃者腹痛嘔腐養胃湯去薤附肉果或大和中飲去乾薑澤泄傷寒少陽症

噦逆者半表半裏氣爲邪抑小柴胡湯或柴陳煎寒加丁香火加黃芩傷寒陽明症失

下內熱三焦乾格陰道不行氣衝作呃者宜去火白虎湯竹葉石膏湯加減去

閉承氣湯逆氣降噦自止其吐利後胃虛膈熱而呃者橘皮竹茹湯加川貝其

病後發呃者察其中虛必補脾察其陰虛必補腎大補元煎右歸飲其中

焦脾胃虛寒氣滯爲呃者丁香柿蒂散或理中湯溫胃飲俱加丁香其下焦虛寒肝腎

不能暢達或虛人元陽無力易爲遏抑而致呃者歸氣飲或理中陰煎加丁香丹

溪謂呃逆因肝腎陰虛氣從臍下直衝於口由相火挾衝氣上逆

者用大補陰丸峻補真陰承制相火東垣謂陰火上衝吸氣不得入胃脉反逆陰

中伏陽。卽爲呃。用滋腎丸壯水。以瀉陰中伏熱。此陽虛陰虛之辨。
所當詳審施治者也。產後呃逆最危。四逆湯加人參。羌活附子湯。或桂心五錢。薑汁三合。水煎。
急灸期門左穴。艾炷如豆大。醫通曰。平人飲熱湯。及食椒薑卽呃。
者。此胃有寒痰死血也。死血。用韭汁童便。虛人。用理中湯加蓬朮。下越鞠丸。桃仁。煖加茯苓。半。
蓋呃逆皆是寒熱錯雜。二氣相搏。故治之亦多寒熱相兼之劑。
如丁香柿蒂並投之類。試觀平人令呃。令其思想則止。思則脾火
氣乘而胃和矣。

呃逆脉候

呃逆如身強氣盛。脉見滑實者。多宜清降。若聲小氣微。脉見微弱
者。多宜溫補。

寒滯消痰 寒火呃逆 氣逆肝火 滯食

附方

丁香散

丁香 柿蒂各一錢 青皮 陳皮 炙草 良薑 各五分

二陳湯

夏 陳 苓 草 薑 加丁香名丁香二陳湯

橘皮乾薑湯

橘皮 通草各錢半 參 桂各一錢 乾薑 炙草各五分

安胃飲

見本卷脾胃

橘皮竹茹湯

見本卷嘔吐

旋覆代赭湯

見本卷嘔吐

左金湯

黃連 吳萸

養胃湯

藿 陳皮 各一錢 夏各一錢半 砂仁 肉果 人參 白朮 各一錢 神麴 甘草 丁香 薤仁 沈香各七分

麥芽 各一錢

神麴 甘草 川附三分

消食少陽少陽明胃火補脾補腎氣滯虛寒胃寒

大和中飲 見本卷飲食

小柴胡湯 見一卷溫

柴陳煎 卽二陳湯加柴胡

白虎湯 見一卷中風

竹葉石膏湯 見一卷傷風

大補元煎 見一卷中風

右歸飲 見二卷虛損

丁香柿蒂散 丁香 柿蒂 良薑 參 夏 陳 苓 草

理中湯 見一卷中風

溫胃飲 見一卷中風

陽虛陰陽陰虛陽

歸氣飲

熟地三錢
薑一丁香

茯苓 扁豆各一錢
陳皮各一錢 炙草八分

藿香錢半

炮

理陰煎

見二卷欬嗽

大補陰丸

見一卷火

滋腎丸

見一卷火

四逆湯

附子

乾薑

甘草

羌活附子湯

羌活 香五分

附子

炮薑各一錢

茴香八分

丁

越鞠丸

見本卷諸氣

呃

噎逆連聲日夜不止醫用丁香柿蒂散加白蔻木香刀豆

之屬隨止隨發悶絕而甦坐不能卧診其脉虛浮而疾逆氣自

丹田上升直犯清道此肝邪犯胃也丁香柿蒂香辛溫助火何濟

於事用重以鎮逆法旋覆代赭湯去人參加石決明醋煨刺蒺藜

醋炒以瀉肝半夏青鹽製以降痰沈香磨汁以下氣一吸逆氣鎮定神

安熟寐夢一老嫗引小兒以手將其左脇曰愈矣醒而呃逆大

減再劑若失問所夢何人予曰此鎮肝而心脾之神得安也蓋

脾之神黃婆心之神嬰兒云

薛 痰火呃逆身熱欬嗽脉浮數此肺受火灼膈上痰結遂失肅

清下降之權治用苦辛降逆橘皮竹茹湯去參草加山梔杏仁
前胡貝母栝蒌豆豉鬱金汁再劑悉平

潘 冬初寒熱自利煩渴不寐嘔吐濁痰右脉小數糲糊左關弦

而微勁是協熱下利胃虛木欲乘土必作噦逆治先表裏清解

做景岳柴陳煎柴胡黃芩半夏麴茯苓陳皮栝蒌枳殼薑寒熱

退煩渴解而呃果作此繫濁痰不降木氣上升宜降痰兼鎮逆

用蘇子杏仁

俱炒研

橘紅竹茹茯苓赭石石決明

醋煨研

薑汁一服

左關脉平再服呃逆亦定惟右關虛乃商鎮補中宮法所謂胃

虛則呃也用山藥扁豆薏仁

俱炒

炙草半夏陳皮茯苓沈香汁呃

平但宵分少寐上脘略悶則痰沫隨氣上泛呃仍間作治用通

攝佐以運脾所謂脾能爲胃行其津液也萆仁煨薑薏米生扶
神橘白砂仁半夏蓮子氣平呃止思食前方去萆仁加潞參山
藥萆仁健飯如初

包 呃逆嘔沫食後爲劇是肝胃病據述陰瘡愈後夏秋浴池兼
咳生冷遂致嘔呃不時寒慄夫肺主皮毛水寒外襲感病在經
胃主通納生冷傷陽氣隨濁逆怯寒乃肺衛虛非在經客邪仲
景以嘔涎沫爲肝病肝病必犯陽明胃腑先用溫通泄濁吳茱
萸湯加半夏椒目嘔逆止再用旋覆代赭湯而呃平

桂 病後脉虛疾左關尺尤駛胃虛呃逆必肝腎之氣上奔而陽
明當其衝因作呃也化痰利氣是開其道矣有年體虛法宜鎮

攝牡蠣

醋煨三錢

石決明

煨研二錢

赭石

錢半

竹茹

錢二

潞參

降香末各三錢

一

服呃止再劑去決明赭石加茯神棗仁遠志山藥服脉亦和

餽症論治

餽症屬胃。俗云心餽非也。其狀似飢非飢。似痛非痛。脘中懊懣不安。或兼噯氣痞悶。漸至吞酸停飲。胸前隱痛。丹溪謂皆痰火為患。或食鬱有熱。華岫雲謂脾屬陰主血。胃屬陽主氣。胃易燥。全賴脾陰以和之。脾易濕。必賴胃陽以運之。合冲和之德。為後天生化之源。若胃過燥。則餽雜似飢。得食暫止。治當以涼潤養胃。陰如天冬。竹柏子仁。石斛。蓮。棗之品。或稍佐微酸。如白芍。棗仁。木瓜之屬。若熱病後胃津未復。亦易虛餽。治當以甘涼生胃液。如生熟地黃。當歸。沙參。蔗汁之屬。或但調其飲食。凡甘類。若胃有痰火。或惡心吞酸。微煩少寐。似飢非飢。治宜清火。如黃梔。俱用薑汁炒。稍佐降痰。如二陳湯。及橘紅。半夏。薤白。又有脾胃陽衰。積飲內聚。

似酸非酸似辣非辣治宜溫通。外臺茯苓飲加減。但由脾虛飲食不化吐

沫愛腐治宜健運。六君子湯加砂仁雞內金。或肝火作酸。佐金。饘雜醋心。黃湯。

食後愛腐。保和。濕痰阻氣。氣鬱。婦女悒鬱胸膈。逍遙散。下血虛心。

饘。宜地黃白芍天冬。大抵脉洪數者多火。宜薑汁炒山。脉滑大者。

多痰。宜導痰湯加。脉沈弦者多鬱。又有過用消克藥飢不能

食精神漸減。異功散加白芍。皆饘症所當審治者。

醫通曰饘雜與吞酸一類皆由肝氣不舒木挾相火以乘脾土胃

之精微不行濁液攢聚為痰為飲都從木氣化酸肝木搖動中土

中土擾擾不安故饘雜如飢求食自救得食稍止止則復作蓋土

虛不禁木所搖治法必補脾運痰土厚載物則風木自安不必伐

肝。但以六君為專藥。若火盛作酸。加吳茱萸。若不開鬱補土。務攻其痰。久久致虛。必變反胃痞滿眩暈等病矣。

附方

二陳湯 見一卷中風

外臺茯苓飲 見一卷中風

六君子湯 參 苓 朮 草 加陳皮名異功 加半夏名

左金丸 見一卷火

吳茱萸湯 茱萸一味

保和丸 見二卷痰飲

氣鬱湯 苓 夏 芎 陳 貝 梔 草 香附 蒼朮

鬱開導消濁降肝平運健通溫痰降

散

逍遙散

見一卷火

降

導痰湯

見一卷中風

鬱治

越鞠丸

見本卷諸氣

噯氣論治

噯氣。卽內經所謂噫也。經言脾病善噫。又言寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故爲噫。後人因謂脾胃氣滯。起自中焦。出于上焦。凡病後及老人脾胃虛弱者。多有之。願亦有肝氣逆乘噯酸作飽。心下痞鞭。噫氣不除者。仲景謂胃虛客氣上升。必假重墜以鎮逆。旋覆代赭湯。亦有肺氣失降而作噯者。蘇子降氣湯。去桂。其胃虛氣滯而作噯者。十味保和湯。其胃寒氣滯而作噯者。和胃煎。其胃虛嘔痰噯氣者。和胃二陳煎。其胃寒飲食難化時作虛飽噯氣者。養中煎。或如脾腎虛寒。命門火衰。濁陰不降。致痞滿噯氣者。理陰煎。如胃有痰火噯氣者。星夏梔子湯。崑山脾胃陽虛。中氣爲陰邪阻格者。和中爲要。脾健。

散。若木來乘土厥逆上干之氣非鎮制不能遏也

附方

旋覆代赭湯 見本卷嘔吐

蘇子降氣湯 見二卷失音

十味保和湯 參 朮 苓 夏 陳 藿 草 香附 砂

和胃煎 檳 陳 藿 草 或加苓 夏 丁香 木香

和胃二陳煎 見本卷飲食

養中煎 見本卷飲食

理中丸 見一卷中風

理陰煎 見二卷咳嗽

鎮逆降氣虛滯寒滯驅痰虛飽溫中火衰

炭火和中

星夏梔子湯

半夏

南星

香附

石膏

梔子

健脾散

人參
炙草

白朮

丁香

藿香

砂仁

肉果

神麴

噯

姪 左脇痞悶上撐胸臆頻噯不舒按丹溪云凡上升之氣自肝而出左脇肝部也痞而上逆必犯胃倣仲景旋覆代赭湯成氏所謂鹹以軟堅重以鎮逆也代赭湯去甘草薑棗加廣皮栝萸皮枳壳俱麩炒三服而愈

痞滿論治

心下滿而鞭痛爲結胸。滿而不痛爲痞。痞則閉而不開。滿則悶而不舒。病在胸膈氣分。而外不脹急。但不知飢。不欲食。脉緩弱。或虛弦。不宜過用消耗。重損元氣。經云。太陰所至爲痞滿。保命集曰。脾不能行氣於肺胃。結而不散。則爲痞。傷寒之病。從外之內。故宜苦泄。雜病之痞。從內之外。故宜辛散。治傷寒熱痞。用苦寒藥。大黃黃連瀉心湯。治傷寒陰陽不和而痞。兼用寒熱藥。三黃加附子湯。治傷寒陰盛陽虛而痞。則辛甘藥多。而苦寒藥少。半夏甘草生薑諸瀉心湯。二黃瀉心湯。治傷寒心下痞。關上脉浮。治傷寒熱痞。半夏瀉心湯。治胸滿而嘔。甘草瀉心湯。治胃虛氣逆。生薑瀉心湯。治脇有水氣。痞雖虛邪。然表氣入裏。熱鬱於心胸之分。必用苦寒。

為瀉。辛甘為散。諸瀉心湯所以寒熱互用也。雜病痞滿亦有寒熱

虛實之不同。如胃口寒滯停痰痞悶者。辛溫泄瀉。橘皮半夏湯。或二陳湯加丁香。

飲食寒涼傷胃致痞者。溫中化滯。和胃煎。加查肉。麥芽。砂仁。或厚樸。溫中湯。脾胃陽微。

胸不清曠者。辛甘理陽。苓桂朮甘湯。中氣久虛精微不化者。升清降濁。

補中益氣湯。加猪苓。澤瀉。醫通曰。升柴從九地之下。而脾虛失

升其清。苓泄從九天之上。而降其濁。所以交否而為泰也。脾虛失

運。食少虛痞者。溫補脾元。四君湯。胃虛氣滯而痞者。行氣散滿。保和

湯。或三因七氣湯。食滯未除作痞者。專消導。大和中飲。或枳朮丸。資生丸。食滯既消。脾

氣受傷者。宜調補。異功散。養中煎。心脾鬱結而成痞者。調其氣。歸脾湯。治中湯。暴

怒傷肝氣逆而痞者。舒其鬱。解肝煎。肺失肅降。痰熱阻痺者。清理上

焦。清肺飲。去五味。甘草。加豆豉。煎。氣閉化熱。不食便秘者。辛潤開降。

桔槳山梔。竹茹。枇杷葉。枳殼。

薤仁杏仁麻仁栝蒌仁貝母熱邪裏結惡心中痞者苦酸泄降半
竹茹石解鬱金或小陷胸湯熱邪裏結惡心中痞者苦酸泄降半
瀉心湯去參甘暑邪阻氣熱渴滿悶者暑邪面垢脈辛涼清上三
棗加枳芍烏梅暑邪阻氣熱渴滿悶者虛胸悶脘痞辛涼清上三
香薷飲消暑九加桔梗竹瀝邪阻氣嘔惡胸痞者不飢脘痞惡心
茹杏仁茯苓滑石鬱金非濕邪阻氣嘔惡胸痞者不飢脘痞惡心
脈甘淡滲濕六一散加蘆根茯苓杏仁薤仁寒熱往來胸脇痞滿
緩甘草淡滲濕通草蘆根半夏薤仁或平胃散寒熱往來胸脇痞滿
者和解半表半裏小柴胡湯加枳桔栝蒌皮噎膈痞塞乃痰與氣搏不得宣通
痰為氣激而升氣為痰膩而滯故痞痰挾瘀血成窠囊作痞脈沈
塞而成噎膈也連理湯生薑瀉心湯痰挾瘀血成窠囊作痞脈沈
瀉日久不愈惟悲哀鬱抑之人有之宜從血鬱治桃仁紅花丹皮
香附降香蘇木

韭汁
童便

痞滿脈候

脈弦急而滑胸驟痞乃肝氣與食滯所成為實脈弦或沈瀉或虛

大無力氣口爲甚此脾胃受傷爲虛寸口脈沈滑遲滑爲有滯

附方

大黃黃連瀉心湯 大黃 黃連 加黃芩名三黃瀉心湯

附子瀉心湯 芩 連 大黃 附子

半夏瀉心湯 見一卷溫 若除人參加甘草名甘草瀉心湯

生薑瀉心湯 卽半夏瀉心湯加生薑

橘皮半夏湯 陳 夏 薑

二陳湯 見一卷中風

和胃煎 見本卷噯氣

厚樸溫中湯 樸 陳 芎 草 木香 豆蔻 乾薑

熱痞惡寒脇水痞嘔消痰痰痞溫中溫中

理陽補中補脾和補散滿消滯消補清補溫補

苓桂朮甘湯 見二卷痰飲

補中益氣湯 見一卷中風

四君子湯 參 苓 朮 草 加陳皮名異功散

保和湯 參 朮 木香 藳香 陳 藿香 砂仁 香附

三因七氣湯 見二卷欬嗽

大和中飲 見本卷飲食

枳朮丸 枳實一兩 朮 丸米飲下 白朮二兩 為末以全荷葉裏燒飯湯

資生丸 參 朮 查肉 陳 苓 黃連 扁豆 麴 樸 草 山藥 蓮子 麥芽 苡苳 苡實

桔梗 藳香 蜜丸

養中煎 見本卷飲食

頁
卷
方
名
古
方
集
卷
之
一
方
名
古
方
集

歸脾

歸脾湯

見二卷勞瘵

溫

治中湯

見本卷飲食

利

解肝煎

見本卷諸氣

和

清肺飲

見二卷痰飲

理

小陷胸湯

見一卷溫

結

三物香薷飲

香薷一兩

厚樸

扁豆各五錢

冷服

祛

消暑丸

見一卷暑

却

六一散

見一卷溫

淡

平胃散

朮

樸

陳

草

除

小柴胡湯

見一卷溫

濕

燥

暑瀉

連理湯

見一卷暑

痞滿

金氏寒熱拘急脉不緊數胃痛飲入輒嘔中焦痞阻溺瀦痛宜宣
通法白通草製半夏橘白草豆豉枳壳蘇梗赤苓甘草梢煨薑
一啜症減痞滿未除用瀉心法半夏黃連俱薑汁炒黃芩乾薑陳皮
枳壳甘草梢木通山梔二服全安

殷氏身熱胸痞氣促微欬嘔吐粥飲痰粘溺瀦經止數月脉息三
五不調兼帶浮數醫投桂附熱劑致咽喉腫礙格陽於上予謂
此懷妊惡阻兼外感也宜辛涼以解痰熱用豆豉杏仁薑皮鮮
竹茹陳皮茯苓製半夏枇杷葉二服熱退痞消

張氏寒熱似瘧胸痞不食汗止腋下閱所服方混用枳樸查葉檳

榔青皮之屬此邪在上焦誤行克伐徒傷中下焦耳予用半夏
瀉心湯去苓連甘草加柴胡煨薑萆皮蘇梗茯苓數服隨愈
巢氏發熱胸痞時嘔脹入背脇脉沈小倣小陷胸湯用半夏枳實
枳壳陳皮茯苓加薑煎二服病除

腫脹論治

腫在外屬水。脹在內屬氣。腫分陽水陰水。脹別氣實氣虛。因濕熱
濁滯致水腫者為陽水。因肺脾腎虛致水溢者為陰水。濁氣在上
為實。脹中氣不運為虛。脹辨其位則臟腑脈絡皮膚上下表裏皆
有之。辨其因則寒熱濕痰氣血鬱滯蟲積皆致之。經云三陰結謂
之水。三陰手太陰肺也。足太陰脾也。又云濁氣在上則生脹。此實也。又曰飲食起
居失節入五臟則腹滿閉實。此虛也。又曰臟寒生滿病。此寒也。又曰諸
脹腹大皆屬於熱。此熱也。又曰營氣循脈衛氣逆之為脈脹。衛氣併
脈循分。內。為膚脹。又經論五臟六腑之脹甚詳。不備錄。岐伯曰水
始起目窠微腫如新卧起之狀。其頸脈動時欬。陰股間寒足脛腫。

腹乃大水已成。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。如光腫此水腫

也。膚脹者。寒氣客於皮膚。蠱蠱然不堅。腹大身盡腫。皮厚。按其腹。

窅而不起。腹色不變。此膚脹也。皮厚色蒼。一身盡腫。或自上而下。或多屬氣。皮薄色澤。腫有分界。或

自下而上。鼓脹者。腹脹身皆大。大與膚脹等。色蒼黃。腹筋起。此鼓

脹也。膚脹屬肺。鼓脹屬脾。別有蠱脹。因氣血鬱痺。久則凝滯不行。腹形充大。

中實有物。非蟲卽血。非如鼓脹之腹皮弼急。中空無物也。有單腹

脹。四肢不腫。但腹脹也。症最難治。亦名蠱脹。經言諸濕腫滿。皆屬於脾。

又言其本在腎。其末在肺。皆積水也。腎何以聚水。腎者胃之關也。

關門不利。故聚水而從其類也。是知腫脹無不由肺脾腎者。以肺

主氣。化脾主運輸。腎主藏液也。且脹不必兼腫。腫則或兼脹。亦有

腫脹並至者。病在水分。以治水為主。而兼理氣。氣化水自化也。病在氣分。以理氣為主。而兼利水。水行氣亦行也。但其間虛實必辨。凡陽症必熱。熱者多實。陰症必寒。寒者多虛。溺赤便秘。脉數有力。為實。溺清便瀉。脉微無力。為虛。實者六淫外客。飲食內傷。忽然浮腫。其來必速。虛者情志操勞。酒色過度。病後氣虛。其腫漸至。知此而後治法可詳。治水腫必健脾導水。實脾飲。治鼓脹必通腑疏肝。果草厚樸。益智。青皮。枳殼。牛膝。腹皮。濕在下者用分利。小分清飲。濕在上中下者用分利。通草。杏仁。厚樸。海金沙。木通。雞內黃。陳皮。葶子。濕濁在裏者潔淨腑。四苓散。六一散。利風水脉浮者開鬼門。越婢湯。越婢湯。肺脾不運者消皮水。防也。風水脉浮者開鬼門。鬼門。開發汗也。肺脾不運者消皮水。防茯苓湯。五皮飲。按五水。風水。皮水。正水。石水。黃汗也。仲景曰。風水脉浮。骨節疼痛。惡風。皮水脉亦浮。跗腫。按之沒指。不惡風。腹如

鼓不渴。當發汗。正水脉沈遲。身發熱自微。石水脉沈腹滿不喘。黃汗水脉沈遲。發熱胸滿。四肢頭面腫。久不愈。必發癰膿。肺氣

壅熱者用肅降。麥門冬湯。加茯苓皮。山梔。腕痞鬱熱者用苦降。半

瀉心。清陽痺結者通腑陽。枳實。杏仁。半夏。胃滿濁逆者洩肝木。杏

厚。撲。檳榔。椒目。胃陽虛者用溫通。人參。橘白。半夏。脾陽虛者用健

運。六君湯。加。脾腎陽虛者用氣化。湯。腎氣。中氣陷者用升提。補中。木

邪侮土者和肝胃。木香。枳殼。白芍。竹。肝經鬱熱者降逆火。山梔。丹

鉤。藤。青。暴怒傷肝者平逆氣。煎。解肝。三焦壅滯者用疏利。廓清。濕熱

皮。金。橘。食滯中滿者專消導。和中。氣虛中滿者兼消

夾滯者兼消利。雞金。氣虛兼寒者宜溫補。理中湯。氣血鬱積夾濕熱者平肝

補。中。湯。氣虛兼寒者宜溫補。理中湯。氣血鬱積夾濕熱者平肝

小。溫。清。濁。混。淆。氣。喘。溺。少。通。身。腫。脹。者。煖。下。洩。濁。禹。餘。糧。丸。濕。熱。痰。

積脉實有力者滌宿水。禹功散導水丸。神佑丸。血沫凝滯經隧者利搜逐。

承氣。脹實堅滿拒按者。大小承氣湯。病後虛腫及產後而浮足腫者補。

元氣。六君湯。單腹脹症多屬肺腑宜通勿川滋膩守補。沙苑子益智茯苓牛膝。

膝似殼車前子砂仁殼麻仁郁李仁椒目杏仁括蕁仁大腹皮。

單腹脹俗名蜘蛛脹。腹腫四肢瘦山脾氣虛極真臟已傷也論中。

宜活參。婦人先腫脹而後經斷者為水分。先經斷而後腫脹者為

血分。水分通經丸。血分通經丸。先喘而後脹者治在肺。五皮五先

脹而後喘者治在脾。理中湯。水腫先起於腹後散四肢者可治先

起於四肢後歸於腹者死。凡病水分皆陰勝與氣分不同水腫症

而上按肉如泥腫有分界痛在氣分則凡虛腫溺瀦。香蘇濕勝不

陽症陰症皆有之若病在水分多陰症。五皮因於脾者。補中因腎陰

腫脹

虛。眞。陽。無。以。化。者。

六味地加
牛膝車前

因腎中命火衰不能蒸動關門者。

腎氣

夫水爲至陰其標在肺其本在腎其制在脾腎虛則關閉其水

必逆而上泛脾不能制而反爲水所漬故肌肉浮腫肺不能化而

反爲水所凌故氣息喘急皆陰勝之害也經言膀胱藏津液氣化

則能出所謂氣化者卽右腎命門眞火也火衰則不能蒸動腎之

關門而水聚焉。

腎氣丸

以桂附

蒸動其關積水始下以陽主開也此法

不獨治水腫凡治脹者其要亦在通陽而已。

凡下氣虛乏中焦氣壅欲散滿則恐虛其下欲補下則滿甚於中。

當以

啓峻湯

峻補其下疏啓其中故氣得峻補則上行而啓其中中

焦運行壅滯疏通中滿自消下虛自實經所謂塞因塞用也若水

腫喘促。清理肺氣爲主。凡禽畜無肺者無溺。故水腫宜清肺也。
腫脹症。須分陰陽。濕熱壅滯屬陽。濁氣凝聚屬陰。陽症按之痛。陰
症按之不痛。陽症起於中焦。陰症起於下焦。陽症治在腑。陰症治
在臟。陽症宜清。陰症宜溫。毫釐千里。不可不辨。

腫症易治。脹症難治。腫辨陽水。陰水。陽水易治。陰水難治。脹症頭
緒更多。首辨有形無形。無形則輕劑宜通。有形則重劑攻伐。又須
辨在絡在經。在腑在臟。經絡易治。臟腑難治。又須察虛實。實者可
治。虛者難治。此其大綱也。然後再辨其因寒。因熱。因濕。因痰。因氣。
因血。因滯。因積。審而治之。

徐靈胎曰。脹滿症。即使正虛。終屬邪實。古人慎用補法。又脹必有

濕熱倘脹滿或有有形之物宜緩下之。積有異宜
按脹在腸胃則食入脹加治在通腑若二便通調則脹在臟脾腎
等臟如靈樞所論。或脹在腸外三焦脂膜間靈樞所以謂脹皆在臟腑之
外排臟腑而廓胸脇也。治在辨其陰陽虛實上下表裏皮膚經絡。
氣分血分水分。因寒因熱因濕因鬱因痰飲因積滯或有形無形。
宜汗宜利宜分消宜辛泄宜清肅宜溫通宜升舉宜疏利宜補攝。
宜開鬱宜緩攻宜軟堅化痞宜理瘀導滯要在宣通勿用守補若
腫症身面大勢已退其肢節足跗之水濕浸淫未消宜針刺以決
其流此出路也。

腫脹脉候

沈而滑浮而遲。弦而緊者。皆水腫。盛而緊。大堅以濇。通而滑者。皆
脹滿。二病之脉。實大可治。虛微難治。腫由腹散入四肢。可治。由
四肢脹入腹。難治。凡水腫病。唇黑肝傷。缺盆平。心傷。臍突脾傷。背
平。肺傷。足心平。腎傷。五者不治。靈樞經曰。腹脹身熱。脉大一逆也。
腹鳴而滿。四肢清泄。脉大二逆也。腹脹大四末清脫。形泄甚三逆
也。腹脹便血。四逆也。並不治。腹脹肚見青筋。腹脹便泄。久瘡虛腫。
皆不治。

附方

實脾飲

見一卷濕

小分清飲

見一卷濕

陽水 洩瀉 渴利 濕風 水皮 水腫 膚水 腹水 肺水 痞滿 健運 陽虛

大橘皮湯

五苓散合六一散

再加陳皮

木香

檳榔

四苓散

見一卷暑

六一散

見一卷溫

越婢湯

見二卷發嗽

防已茯苓湯

防已

黃耆

茯苓

甘草

桂枝

五皮飲

大腹皮

赤茯苓

陳皮

桑白皮

薑皮

麥門冬湯

麥冬五十枚

粳米五十粒

半夏瀉心湯

見一卷溫

六君子湯

見一卷中風

金匱腎氣丸

見二卷虛損

補中 肝逆 三焦 消滯 消導 消補 溫補 溫胃 濕熱 寒濕 濕熱

補中益氣湯 見一卷中風

解肝煎 見本卷諸氣

廓清飲 陳芥子 苓 枳 樸 澤瀉 大腹皮 萊菔子 白

雞金散 雞內金 沈香 砂仁 陳香櫟 爲末參湯下

和中丸 陳蟲 香附 夏 枳 查 麴 麥芽 砂仁 五穀

寬中湯 陳薑 苓 夏 枳 查 麴 朮 樸 萊菔子

理中湯 見一卷中風

溫胃飲 見一卷中風

小溫中丸 二陳湯加白朮 神麴 生香附 苦參 黃連

禹餘糧丸 禹餘糧 蛇含石 針砂 羌活 川芎 蓬朮

類證治裁

卷之三

腫脹

藥

導水攻下峻下蓄血攻滯補脾經斷水脹虛腫

茴香

牛膝

當歸

炮薑

附子

肉桂

研細

神麴糊丸

葉天士去附子蓬朮青皮

加茯苓

禹功散

黑牽牛

茴香

薑汁調服

或加木香

神芎導水丸

芩水丸

連

黑丑

川芎

薄荷

大黃

滑石

舟車神佑丸

甘遂

大戟

芫花

大黃

輕粉

黑丑

桃仁承氣湯

見一卷痰

大小承氣湯

見一卷溫

歸脾丸

見二卷勞瘵

通經丸

赤芍

歸尾

生地

川芎

牛膝

紅花

桃仁

五皮五子飲

五皮飲加

蘇子

車前子

大腹子

葶藶子

香蘇散

橘紅

防已

木通

蘇葉

生薑

入猪肝煮醃蒜食

利濕氣虛消補胃陰喘脹膚脹蠱脹導水瀉

胃苓湯 見一卷中風

白朮散 朮 苓 陳 麴 砂仁 五穀蟲 荷葉 米湯

枳朮丸 見木卷痞滿

六味丸 見一卷中風

安肺湯 黃芩 桑皮 貝母 花粉 杏仁 知母 天冬

加味枳朮丸 枳 朮 陳 夏 芩 蘇 桔 草 桂

參朮健脾丸 參 朮 陳 苓 歸 芍 炙草 大棗

導水茯苓湯 赤苓 麥冬 澤泄 白朮 桑皮 紫蘇

燈心 水煎 木瓜 木香 大腹皮 陳皮 砂仁 檳榔

二蛟散 芒硝三兩炒乾為末 和老黃米三兩炒研 加黑

血盛產婦血盛堅滿

調營飲

芍

歸

陳

檳榔

蓮花

延胡

白芷

大調經散

大黑豆五錢 茯苓三錢三分

西琥珀三分半

小調經散

沒藥 西琥珀 桂心 白芍

當歸各一錢

當歸散

歸 檳榔

芍

丹

朮

陳

苓

酒

黃調服

桂心

木香

木通

腫脹

弟 寒濕腫脹水漬經隧少腹陰囊腿足通腫大腹按之鞭缺盆
平肢冷目黃面頰俱浮便滑溺少脉沈遲而虛背寒腹熱坐不
得卧病在水分法先分消佐以通陽防已木通大腹皮洗猪苓
茯苓薏米半夏砂仁壳附子薑三服腫退肢暖命却鹹食淡然
後主以健運佐以淡滲去防已木通腹皮附子加生朮雞內金
炙半夏炒杜仲數服食進微汗出囊濕便乾此經腑水濕俱
有出路惟診左尺虛酌腎氣湯桂心牛膝車前茯苓山藥椒目
茵陳五加皮薏米十數服悉愈後常用八味丸調理得安
姪孫由腿脛腫入腹漸至胸脇堅滿法在不治姑與分消之劑得

汗腫畧退然寒濕內蘊非溫通不愈用厚樸桂心附子牛膝茯苓大腹皮砂仁壳老薑三服由面目退及胸腹又數服腿足腫全消

王 陰瘡服劫藥瘡止面色晦黑決其後必病脹不信予曰劫痰暫效邪原未淨一也今卯月中旬木火司令一逢辰上濕痰內動脾陽失運必變中滿二也毒品易犯食忌三也面黑無澤腎水侮土小便不利四也後果如言視其目窠微腫如新卧起狀知其裏水先用實脾利水之劑再用金匱腎氣丸料煎湯數十服腫脹悉退藥乍止時交未月濕土已旺漸脹小溲不利又服前丸兩月全愈

族某軀長體壯病腫脹或用破氣消滯之品服益劇行立腸幾裂
出臍突缺盆平法本不治診其脉細如絲度必勞力傷精脾腎
兩憊之症詢所由自言長途輦重邇間出浴酒後入房忽覺溺
瀉通是濁血驚眩欲仆食減腹膨綱急欲死遂用腎氣丸料大
劑煎服減附子丹澤熟地炒炭用一劑腹有縐紋再劑缺盆現
溺爽膈寬又數服腹脹漸退仍用加減腎氣丸服經言用力舉
重若入房過度汗出浴水則傷腎故與腎氣方合後不守禁忌
飽食山芋及未熟雞蛋脹復作求治予言前方必不驗卒如言
房兄病後失調面浮跗腫腹膨食少小水短濇腰膝乏力經言諸
濕腫滿皆屬於脾然土衰必補其母非命火不能生脾土且腎

爲胃關開門不利故聚水必得桂附之陽蒸動腎氣其開始開
積水乃下經所謂膀胱氣化則能出也用桂附參朮炮薑茯苓
車前牛膝砂仁陳皮山藥爲丸一料而安

陳 傷酒病單腹脹診其脉知脾陽虛用葛花解醒湯加牛膝枳
椶子腹寬展能進食矣後用參朮健脾丸去炙草大棗加益智
仁 砂仁壳服愈

韋 病後感寒腹痛漸成脹滿脉沈微弱少食入脹加脾陽不行
治以溫通則脹已小茴香大腹皮 洗 草果木通砂仁益智仁 煨
茯苓廣皮煨薑空心四服而愈

石 腹脹不飢小水不利脉沈瀟腑氣痺窒不宜用砂仁壳枳壳

木通茯苓益智仁草果俱煨五穀蟲雞內金俱炙萊菔子炒研數服愈

陳 五旬以上病單腹脹食後作飽得氣洩畧寬明係胃病服謬

藥浸至腸滿跗冷脉來沈濡左關微弦症由肝氣久衰疏泄失

職氣分延虛漸干水分致噎乾口燥小水不清化源乏力矣通

陽佐以益腎通陽則傳送速益腎則氣化行腹脹自寬沙苑子

韭子懷牛膝酒蒸各錢半益智仁煨橘白砂仁壳各一錢茯苓三錢杞子

大腹皮洗各二錢枳壳麩炒錢二分十服脹寬口潤便爽跗溫右脉漸起

惟兩尺虛不受按加補骨脂核桃肉去腹皮枳壳食宜淡戒腥

膩難化及一切壅氣食物再以猪肚納卵蒜其中紮定淡煮食

之腑氣通則納食不壅服之甚通暢脹去七八矣又加沈香牡

蠟十數服小腹之鞭者亦輒焉

族女腕脹愛腐經遲腹痛間發寒熱按東垣云胃爲衛之本脾乃營之源脾胃陽衰納運不旺致脹滿瘀停宜乎營衛失度衝任不調矣倣內經濁氣在上則生脹脹之例以通陽降濁一陳湯去甘草加白蠟壳韭子益智子俱炒小茴香穀芽神麴俱炒香附薑煨薑數服諸症皆平

沈氏胎前腹滿產後面目肢體浮腫欬頻溺少此肺氣不降水溢高原也或勸用腎氣湯予力阻不可一服而小水點滴全無服益甚脉虛濡欲絕用五皮飲參茯苓導水湯去白朮木瓜檳榔腹皮加杏仁蘇梗栝蒌皮冬瓜皮製半夏數服腫消腹漸寬矣

後用茯苓半夏生朮砂仁薏仁陳皮蘇子木香厚樸水泛丸服
二料遂平 按肺爲水之上源主氣此症水阻氣分以肺不能
通調水道下輸膀胱故溢則水留而爲脹其症年餘無汗得蘇
杏微汗而腫消得五皮行水而便利兼倣內經開鬼門潔淨府
遺法也

李氏有年食入氣壅繞臍積冷脹連胸脇溺少便澹脉沈微全是
腑陽向衰濁陰凝結前用二苓木通開太陽之裏砂仁陳夏理
太陰之滯乾薑厚樸薏仁溫通利濕冷脹減便溺爽而胸痺未
舒猶是中脘清陽不旋之故其家用俗傳牛口中蝕出秬稻草
煎湯服甚適予倣用仲景枳實薤白白酒湯加半夏青皮厚樸

烏藥木香旋轉清陽可以納穀

張氏腹膜脹連帶脉腰圍緊掣如束脉堅而搏指此病久兼入奇

經宜通其腑並理帶脉枳實大腹皮懷牛膝

酒蒸砂仁木通

當歸鬚茯苓郁李仁

二錢

鬱金

六分

四劑脹寬帶脉亦不緊掣矣後

去郁李仁枳實加沈香

磨汁三匙

數服全愈

姜氏五旬餘腹膨中空外縑急食入不加脹頭眩耳鳴口乾舌硬

溺赤沫便艱足重墜脉沈微症屬三焦濕鬱生火內經亦謂諸

腹脹大皆屬於熱諸病跗腫皆屬於火若鬱熱不除遂成鼓脹

不治用山梔大腹皮黃蘗知母

俱酒炒

生地麥冬丹皮赤苓冬瓜

皮車前子數服已效後去黃蘗丹皮加海金沙萆薢服得安

睦嫗脾宜升則健胃宜降則和今脘中食入作飽腑氣不司下行
醫用流氣之劑更致腰痛帶下吐瘀診脉右關沈微經所謂濁
氣在上則生臌脹也藥以辛溫通陽泄濁爲宜製半夏砂仁壳
枳壳益智仁韭子茯苓陳皮枳實皮穀芽杜仲煨薑數服諸症
俱除

紀氏先因右脇痛繼而脘腹滿悶食入脹加腑氣失降實由肝失
疏泄左關脉不甚弦右寸近滑恐屬妊兆泄肝通腑仍不礙胎
爲穩椒目砂仁壳茯苓枳實皮杏仁陳皮木香數服而平

趙 童年色萎腹蠱脉疾寒熱無汗溺瀉以腎氣湯治牛膝益智
仁車前子茯苓薏米熟地牡蠣數服病減加參桂砂仁壳服愈

張 小腹乃肝腎部分脹滿溺瀉已屬下焦氣化失司今通大腹
腫硬如石脉右弦大左虛瀉症屬單脹治宜通陽勿用守補黨
參茯苓牛膝炭沙苑子益智仁煨 杞子炭沈香磨汁數服溺爽脹
寬

張 黃疸積年不愈近成單脹腹堅滿食減便瀉乃氣不化水然
神脉頹弱難挽之疴姑用牡蠣薏仁茯苓車前子茵陳砂仁壳
益智仁牛膝桂心數服腹軟溺利伊兄復請終以沈疴辭之

本 陰水腹大腫鞭如石脉緩肢冷囊腫用腎氣湯桂心五分附子
三蒸牛膝二錢車前子一錢茯苓三錢大腹皮錢半椒目廿粒八服囊濕如
淋腹軟溺利加乾薑山藥研末大腹皮煎湯泛丸以通陽崇土防水

而安

張 脇痛脹少腹腫硬誤服攻蕩却劑脹劇氣注舉丸脉沈小右

弦濇乃肝失疏泄氣鬱留濁治先理肝以泄濁厚樸七分小茴香

青皮各錢二分枳壳錢半茯苓各二錢大腹皮三錢延胡八分椒目廿粒車

前子三分四服脇痛疝墜俱止但腹右硬痛不任偏卧食不加脹

二便如常按脉論症單脹何疑然病因臟損治在通攝兼施厚

樸五錢枳壳錢半牡蠣各三錢歸鬚各二錢牛膝一錢桂心三分四

服症平後做腎氣丸用牛膝車前桂心茯苓山藥當歸牡蠣白

芍莢肉蜜丸愈

金氏中年經斷脘腹脹太季脇緊掣如束食下滿逾時痛便瀉日

數行晡後股脛重墜脉陽搏陰微症由癰聚胞宮氣閉血留可
導使下失治則衝病及帶腰圍痼急中下焦氣機鈍窒運納無
權滿痛瘕泄氣虛下陷由來漸矣前年立法溫通腑陽脹寬能
納今先主通降脹緩再議半夏麴茯苓草果煨砂仁壳蘇子橘
白大腹皮川椒目降香三服滿痛除尚調帶絡爲其氣虛則弼
急而陷下也潞參升麻益智子沙苑子茯神牛膝炭當歸續三
五服後腰肋鬆而股脛復常

鄒 六旬外由泄瀉漸次足腫入腹爲脹延及通腹堅滿面浮肢
腫水濕不運溏瀉未止若論平昔嗜飲便紅宜丹溪小溫中丸
分理濕熱然脉來沈小兩尺如絲明係脾腎久衰火土俱弱致

氣鈍濕壅清濁混淆此消導破氣決非治法但溫理脾腎兼佐

泄濕自可向安炮薑三分肉蔻神麴炒各一錢益智仁煨錢半茯苓三錢

膝蒸砂仁壳各一大錢大腹皮洗二錢車前子各八分橘白各八分冬瓜皮二錢倒

蝕牛口和稻草二兩煎湯代水數服腫退瀉止去薑蔻神麴加沙苑子

半夏麴粳米炒數十服脹全消匝月後不節葷茹濕麴復服湯

少仍用牛膝車前茯苓益智仁炮薑萊菔子砂仁麥芽雞內金

俱炒脹消而健

葦 胸高突腹腫鞭面黃鼻衄足腫溺瀦夜分不寐想成童後恣

啖生冷秋冬以來邪痼氣窒延春身熱膝冷食入脹加臟腑經

脉窒痺治先分理濕熱佐以輭堅栝蓰仁山梔茯苓砂仁壳大

腹皮車前子牛膝炒神麴杏仁生牡蠣椒目六七劑脹寬腫輒
者十四五知肝失疏泄脾失運輸分消中宜佐暢肝運脾用陳
皮鬱金蘇梗當歸石斛山梔茯苓薏苡雞內金炙牡蠣表裏分
消而溺利汗出矣惟晡後陽升煩熱頭眩溺色渾行則氣急懼
當春鼻仍易衄治在降陽和陰熟地牛膝俱炒丹皮山梔石斛
薏仁赤苓大腹皮冬桑葉燈心小麥溺清眩熱已惟宵則氣急
寐不甚穩去赤苓加茯苓神萸霜桑皮蜜炙防已炙草數服氣舒而
胸突漸平腹寬而膝冷漸和

積聚論治

諸有形而堅着不移者爲積。諸無形而留止不定者爲聚。積在五臟主陰病。屬血分。血有形而靜者也。聚在六腑主陽病。屬氣分。氣無形而動者也。難經既以積聚分屬臟腑。經曰：外中於寒，內傷憂怒，則氣上逆，六腑所生始發，有常處，痛不離其部，不去，積乃成。曰：難經曰：積者，五臟所生，始發有常處，痛不離其部，上下有終始，左右有窮處，聚者，六腑所成，始發無根本，上下無留止，痛無常處。巢氏病源別立癥瘕之名，以不動者爲癥，動者爲瘕，亦猶難經之積聚而已。第無形之瘕聚，其散易；有形之癥積，其破難治之者，先辨有形無形。在氣在血，可畧得其概矣。其生於五臟者，肺之積曰息賁，在右脇下；肝之積曰肥氣，在左脇下；心之積曰伏梁，在臍上，上至心下；脾之積曰痞氣，在胃脘；腎之積曰奔豚，發於少

腹上至心。上下無時。其見於臍下。爲癥瘕。瘕者按之不移。卽血癥。食癥之屬。瘕者假物成形。如血髓石瘕之類。見於胸脇。爲痞癖。痞乃結塊。在肌肉而可見。癖由內著。結隱僻而難蹤。既分其部。必原所起。初由寒氣瘀血痰沫。交結於胃膜。久而盤踞堅牢。至元氣日削。盤踞日深。攻補兩難措手。惟先理其氣。大七氣湯。排氣飲。氣行則脈絡通。或先調其中。補中益氣湯。參苓湯。脾運則積滯化。其藥性宜辛散溫通。方能入陰出陽。解散凝聚。然初爲氣結。在經久則血傷。入絡必理血。如歸尾。桃仁。蘇木。延胡。鬱金。琥珀。桂心。兼通絡瘀。如歸尾。韭根。鱖鱖甲。搜逐之中。酌補元氣。如五積等丸。用參苓桂附之類。卽邪深積銅。務令脾胃氣旺。乃可消磨。堅結。否則端事攻削。正氣益衰。積聚何由去乎。知養正則邪可除。

而後結者散之。客者除之。留者行之。堅者削之。强者奪之。鹹以軟之。苦以瀉之。和其中外。可使必已。且經曰。大積大聚。毒可犯也。衰其大半而止。懼盡攻其邪。必傷其正也。今條列方治。有息積。病脇下滿。氣逆不妨於食。化氣湯。木香調氣散。有腸覃。寒客腸外。與衛氣搏。因有所繫。癰而內著。瘕肉乃生。始如雞卵。稍以益大。狀如懷子。月事以時下。阿魏麝香散。有石瘕。生於胞中。寒氣客於子門。氣不得通。惡血留止。狀如懷子。月事不以時下。和血通經湯。若不應。見晚二症皆生。於女子。有奔豚。病從少腹起。上衝咽喉。得之驚恐。金匱奔豚湯。有伏梁。環臍而痛。金匱大建中湯。加桂枝。其息。黃肥。氣痞。氣諸積。東垣用五積丸分治。凡通治五積成形堅久。攻積丸。化積丸。通治六聚。隨氣上下。散聚有血瘕。沈氏血瘕丸。

有食癥。大和有疝瘕。導氣有蛇瘕。赤蜈蚣散有鼈瘕。燕薹有髮瘕。香澤

有痞塊。連薤有痞積。脇堅如石。大黃散有胸痞。半夏有肋痞。

右肋有形。有瘧痞。左肋有形。屬有飲癖。口吐清涎。六君有酒癖。傷

推氣散。有茶癖。嗜茶成積。好食茶葉成癖。妙飛麵糊。茶清下。

和太。有茶癖。星尤。好食茶葉成癖。阿魏。或萊有肉積。小

好食生米土灰成癖。大七氣湯。加有麴積。腹子薑酒煎有肉積。阿

魏或狗肉積。杏仁山查有菜菔積。桂香有魚蟹積。紫蘇橘皮有蛋

積。白蔻豆豉。有小腹癥積。形如卵。攻痛有蟲積。雷丸檳榔。子有

血積。跌撲蓄瘀面黃。有寒積。附子理有痰積。導痰有疝積。肥兒

脾胃虛者。六君肝脾虛者。歸脾肝火鬱者。蘆薈憂思鬱者。六鬱肝

腎虧者。腎氣量新久酌虛實或一補一攻或三補一攻以積聚由

漸而成。治必由漸而去。故緩攻通絡。勿峻用吐下。致傷胃氣而損真元也。凡堅頑之積。多在腸胃以外。募原之間。非藥力所能猝及。宜用阿膠膏。琥珀膏。水紅花膏。三聖膏。以攻其外。用鍼法以攻其內。且以艾火灸法消散固結。為尤效。

仲景曰。積聚癥瘕。不轉動者難治。五積中奔豚症最難治。

得效曰。宿血滯氣結為癥瘕。腹中痞塊堅硬作痛。當以破氣藥治之。或以類從。如敗梳治蝨瘕。銅屑治龍瘕。麴蘖治米瘕。石灰治髮瘕。

叔微曰。治積要法。大抵所惡者攻之。所喜者誘之。則易愈。

入門曰。積初屬寒。宜辛溫消導。久則為熱。宜辛寒推盪。

大七氣湯烏白丸

積聚

木香檳榔丸。壯人無積虛者有之。先補虛使氣血旺則積消。木香
通元二八丹

士材曰。嘗製陰陽攻積丸。通治五積六聚。七癥八瘕。瘰癧血痰。食不問陰陽皆效。藥品稍峻。用之有度。補中數日。然後攻伐。不問積去多少。又與補中待其神壯。則復攻之。屢攻屢補。以平爲期。此予獨得之訣。百發百中者也。

積聚脉候

右脇有積氣。肺脉結結甚則積甚。結微則積微。難經五積爲陰。沈伏附骨六聚沈結。痼則沈伏。脉訣脉弦緊爲積。弦緊而微細者。癥也。積聚癥瘕之脉皆弦緊在心下。卽寸脉弦緊在胃脘。卽關脉弦緊在

臍下。卽尺脉弦緊。積脉堅强者。生。虛弱者。死。沈而有力。爲積。沈緊。爲寒。積弦而牢。爲積聚。弦而伏。腹有癥。不可轉。不治。脉經。癥瘕脉多弦。細爲癥。弦急爲瘕。同。鬱脉沈澹。積脉弦堅。丹溪。

附方

通治

陰陽攻積丸

芡黃 半夏

乾薑 橘紅

官桂 茯苓

川芎 各一兩

厚樸 枳實

黃連 巴霜

菖蒲

延胡

人參

沈香

琥珀

桔梗 各八錢

巴霜

另研五錢

皂角六兩

煎汁

泛丸

每服八分

漸加至一錢

半菰湯下

此丸通治五積六聚

七癥八瘕

瘕瘕瘕瘕

血痰食皆效

肺積

息賁丸

厚樸八錢

黃連一兩二錢

人參二錢

炮薑

茯苓

川椒

紫苑各錢半

陳皮

川烏

薏仁各一錢

青皮五分

巴霜四分

各

研末方入巴霜

蜜丸

日減一丸

仍至

二丸再日加增

類證治裁

卷之三

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積聚

積肝

肥氣丸 柴胡二兩 黃連七錢 厚樸五錢 川椒四錢
炙草三錢 莪朮 昆布 人參各二錢半 皂角

去皮弦子煨 茯苓各錢半 川烏錢二分 乾薑 巴霜
各五分 巴霜後入蜜丸 服法照前積塊減半勿服

積心

伏梁丸 黃連一兩五錢 人參 厚樸各五錢 黃芩二錢
肉桂 茯苓 丹參各一錢 川烏 炮薑 紅豆

菖蒲 巴霜各五分
丸同前

積脾

痞氣丸 厚樸五錢 黃連八錢 萊菔三錢 黃芩 白朮
各二錢 茵陳 砂仁 乾薑各錢半 茯苓 人

參 澤泄各一錢 川烏 川椒各五分
巴霜另研 肉桂各四分 蜜丸如前

積腎

奔豚丸 厚樸七錢 黃連五錢 苦楝子酒煮三錢 茯苓
澤泄 菖蒲各二錢 延胡錢半 全蠍 川附

獨活各一錢 川烏 丁香 巴霜另研各五分 肉桂二
分 蜜丸如前 東垣五積丸多用人參且磨積用丸不用

湯取漸次消
磨之義也

氣行

大七氣湯 青 陳 桔 藿 桂 草 三稜 蓬朮 益
智 香附各一錢 一方加大黃 檳榔

初積

排氣飲

香附 木香

烏藥 澤瀉 陳皮 薤香 枳壳各一錢

食加麴藥 寒加薑桂

補中益氣湯

見一卷中風

中調

參苓湯

參 苓 薏苡

草 芎 歸 芍

木香 香附

息積

化氣湯

莪朮 乾薑 青皮 陳皮 丁香 茴香 炙草 各五錢

桂心 木香 各二錢半 胡椒 沈香 各一錢一分 每服

二錢

薑湯下

息積

木香調氣散

青 陳 芎 枳 烏藥 木香 香附 蒼朮 各一錢

桂心 甘草 各三分 砂仁 五分

腸覃

阿魏麝香膏

阿魏 五錢 麝香 一錢 雄黃 三錢 紅蓮花 子 四兩 人參 白朮 各一兩 肉桂 五錢

每服 三錢

石瘕

和血通經湯

當歸 熟地 蘇木 各二錢 三稜 莪朮 木香 貫仲 肉桂 各八分 紅花 三分 血

類證治微

卷之五

積聚

八

石瘕

虛人奔豚

伏梁通治

五積

湯五分 煎服 紅酒

見睨丸

附子四錢 桂 延胡

鬼箭羽 木香各二錢

紫石英各三錢 枳榔二錢半

澤泄 肉 血竭錢

半

大黃三錢 桃仁三十枚

水蛇一錢 糊丸

三稜五錢

水蛇一錢 糊丸

十全大補湯

見一卷中風

金匱奔豚湯

歸 芍 芎 芩

葛根各二錢

草各一錢 薑三片

半夏 甘李

為病未嘗用少陰藥也設泥奔豚為腎積而用伐腎之劑則謬矣

大建中湯

川椒

乾薑

人參

飴糖

攻積丸

茶黃 檳榔

乾薑 茯苓

厚樸 枳實

川烏各一兩 人參

黃連 沈香

橘紅 琥珀

延胡

半夏 麴 各八錢

巴霜五錢

化積丸

蘇木 三稜

莪朮 瓦楞子

阿魏 五靈脂

浮石 水丸

香附

雄黃

檳榔

六聚血積 食積 疝瘕 蛇瘕 龍瘕 髮瘕 瘡瘕 瘰癧 塊瘕 堅塊

散聚湯

二陳湯加當歸

杏仁

桂心

檳榔

血瘕丸

五靈脂 錢

牛膝四錢

甘草梢

桃仁各五錢

生地七

三稜

莪朮

赤芍

官桂二錢

延胡

當歸各六錢

乳香

沒藥各一錢

大和中飲

見本卷飲食

導氣湯

川楝子四錢

木香三錢

茴香二錢

茱萸一錢

赤蜈蚣散

蜈蚣一條炙研酒服

治誤食菜中蛇精或食蛇

燕薹湯

燕薹炒

不拘分兩煎水代茶亦有用雷丸錫灰之

香澤油

香油一升

入香澤煎盛置頭邊令氣入鼻蟲當口

連蘿丸

黃連

吳萸

白芥子

蘿龍子

山梔

川芎

潰堅湯

歸朮

陳

夏枳

查

樸

香附

砂仁

積痞

大黃散

三稜

大黃

薑橘湯下

積堅

化痞膏

三稜

莢朮

當歸各五錢

大黃三錢

全蠍十

入香油二觔四兩

甲片十四片

蜈蚣五條

木鼈子七個

下黃丹一觔

阿魏一兩

乳香 沒藥各五錢

硝石三錢

開水和服

胸痞

半夏瀉心湯

見一卷溫

推氣散

砂仁

肉桂各二分半

木香三分

炙草

茴香

胡椒 丁香

陳皮

青皮

乾薑各五分

蓬朮四分

各一分

癰疽

醋炙鼈甲一兩

三稜

莢朮

香附

青皮

六君子湯

見一卷中風

五苓散

見一卷溫

保和丸

見二卷痰飲

癰疽 脾虛 飲癰 酒癰

茶癖麵積

星朮丸 星朮 青陳

阿魏丸 酒浸阿魏 肉桂 莪朮 麥芽 神麴 萊菔子 青皮 白朮 乾薑 各五錢 百草霜三錢 巴霜

三七粒 糊丸 薑湯下

小阿魏丸 阿魏 山查 各一兩 黃連六錢 連翹五錢 醋糊為丸

桂香丸 肉桂 麝香 飯丸

茴香丸 蘆巴八錢 小茴香六錢 巴戟 川烏 各二錢 川棟肉四錢 茱萸五錢 酒糊丸 鹽酒湯下

妙應丸 附子四個去皮 臍刺孔入 陶砂一兩七錢 麴裏煨 華撥 故紙 青皮各三兩半 糊丸 薑陳皮湯下

桃仁承氣湯 見一卷痰

附子理中湯 見一卷中風

導痰湯 見一卷中風

疳積肝脾火鬱憂鬱腎虛外治

肥兒丸

胡黃連二錢

神麴史君子二錢半

木香一錢

蒸餅爲丸

肉蔻

肉蔻

肉蔻

歸脾丸

見二卷勞瘵

蘆薈丸

蘆薈

川連

胡黃連

木香

青皮

燕薈各五

米糊丸

六鬱湯

見本卷鬱

腎氣丸

見二卷虛損

阿魏膏

羌活

獨活

元參

官桂

赤芍

甲片

生地

土木鱉

二十個

用麻油煎去渣

下黃丹五錢

煎紅花五錢

再入

蘇合油五錢

再入

麝香三錢

阿魏

乳香

沒藥各五錢

再入蘇合油五錢

再入

蘇合油五錢

再入

紅線

上正當

痞塊

用熱

敷斗

敷之

爲末

大蒜搗膏和勻作片貼

琥珀膏

大黃

樸硝各一兩

爲末

大蒜搗膏和勻作片貼

爲末

大蒜搗膏和勻作片貼

爲末

水紅花膏

紅蓼子二錢

酒酢六錢

大黃

樸硝

山梔

石灰各一

共搗成膏以布攤貼

治外

三聖膏 石灰半觔為末瓦器炒令淡紅少頃 下大黃末一兩 候熱退入桂心末五錢 畧炒入米醋熬成膏

以紙攤貼

初積

烏白丸 烏梅肉 生薑各四兩 白礬 半夏各二兩 烏白丸 勻火焙入 神麴 麥芽 青皮 陳皮 蓬朮 搗

丁香皮 夫腹子 各一兩 酒糊丸

久積

木香檳榔丸 大黃四兩 黑丑 黃芩各二兩 木香 檳榔 皮 蓬朮 黃蘗 各一兩 水泛丸 黃連 枳壳 當歸 香附 青皮 陳

積熱

通元二八丹 黃連八兩 白芍 當歸 生地 烏梅各五錢 雄猪肚一個入藥末於內線縫蒸熟搗丸

下 薑湯

攻補

木香枳壳丸 大黃 黑丑各二兩 茯苓 白朮 厚樸 神麴 三稜 蓬朮 麥芽 人參 木香 青皮 陳皮 檳榔 各一兩 薑汁糊丸

積聚

姜

左脇氣逆攻胸久而宿聚妨食作脹醫用硝黃攻奪無形元

氣受傷腹鳴便瀉脘中堅聚成塊診脉左強右弱食少不運木

旺土衰必延吐逆之咎議和肝通腑降濁驅脹白芍牡蠣粉枳

壳栝蘘仁

俱炒

青皮砂仁壳益智仁

煨

茯苓製半夏煨薑五服病

減食加塊亦輒小去枳蘘加黨參生朮扶脾陽而右脉亦振

張

小腹積聚自用大黃鬱金枳實等下瘀血數次暫寬恃氣壯

頻年屢用子謂積聚隨元氣爲消長元氣衰而後邪氣踞之屢

行攻奪終損脾元經言大積大聚其可去也衰其半而止宜扶

脾兼消積爲穩方用六君子料加木香青皮歸尾延胡白芍官

桂之屬水泛丸庶痞積日漸消磨不至損動真元耳

房弟少腹偏左痕聚有形感寒墜痛昔用鍼刺原得痛緩今宿疴
遇勞輒發塊腫不任峻攻倣痛久傷絡之例兼鹹以軟堅主治
宜效特下焦深遠之鄉乃厥陰宗筋所主直達病所良復不易
船茴香橘核俱酒焙 富歸鬚韭子炒 延胡葫蘆巴俱酒炒 牡蠣醋沈
香沖服 三劑痛定腫消塊亦漸軟

房姪右脇上痞脹按之腫滿鄉急漸妨飽食倣石室秘錄輒治法
用生朮茯苓神麴地栗粉鼈甲炙 白芍製半夏白芍 厚樸桂
心潞參蜜丸服以食物壓之效

類證治裁卷之三終